



Bibliografia consultata:

Fernando Piterà - "Compendio di gemmoterapia clinica" - De Ferrari Editore

Tore Swenson - "Guida pratica alla gemmoterapia" - ed. Mediterranee

Le informazioni a seguito riportate hanno solo carattere informativo e divulgativo.

www.natursimul.it

ABIES PECTINATA gemme

INDICAZIONI:

- Anemie.
- Demineralizzazione nei bambini e negli adolescenti (50-70 gocce al giorno).
- Carenze minerali degli adulti e decalcificazione (con Betula pubescens o Betula verrucosa).
- Ritardi e disordini della crescita, (con Betula verrucosa, Prunus spinosa e Rosa canina).
- Fratture ossee e ritardo del loro consolidamento.
- Disturbi della dentizione, carie, paradontosi.
- Carie dentarie da demineralizzazione, con o senza piorrea alveolo dentale, (con Betula verrucosa gemme e Quercus pedunculata).
- Osteocondrite giovanile, osteomielite e postumi di fratture ossee infantili, (con Betula verrucosa).
- Rachitismo e demineralizzazione del bambino e dell'adolescente; quando il bimbo è troppo grande in rapporto alla sua età o il suo accrescimento è troppo rapido, (con Betula verrucosa e Rosa canina).
- Stimolanti della crescita (con Betula pubescens e Rosa canina).
- Ipertrofia ghiandolari e diatesi linfatica; antiflogistico dei plessi linfatici.
- Adenoiditi, tonsilliti e rinofaringiti recidivanti tracheobronchiti dell' infanzia con ipertrofia ghiandolare (30 gocce, 2-3 volte al giorno, con Betula pubescens, Rosa canina e Juglans regia).
- Malattia di Scheuermann (con Betula verrucosa gemme).
- Osteoporosi giovanile e dell'anziano (con Rubus fruticosus e Sequoia).
- Spasmofilia (con Tilia tomentosa).
- Dolori ossei nel bambino: dolori "di crescita".
- Alterazioni neuro-muscolari per carenze del metabolismo calcico.
- Tendenza al raffreddamento (con Ribes nigrum).
- Inappetenza (con Betula pubescens e Rosa canina).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

ACER CAMPESTRE gemme

INDICAZIONI:

- Litiasi biliare colecisto-coledocica con eventuale colangiolite secondaria, (con Fraxinus excelsior).
- Fango o sabbia biliare da bile satura di colesterolo, che determina precipitazione di cristalli colesterolici e microcalcoli, (con Fraxinus excelsior).
- Discinesia biliare (con Rosmarinus officinalis).
- Colestasi intra ed extra epatica in soggetti ipercolesterolemici.
- Dislipidemia- Ipercolesterolemia, (con Juniperus, Olea, Rosmarinus).
- Diabete florido, (con Morus nigra, Olea Europaea e Juglans regia).
- Arteriosclerosi iniziale (con Olea Europaea).
- Nevralgie facciali e intercostali, (con Betula pubescens gemme).
- Nevralgia sciatica.
- Herpes zoster intercostale.
- Nevralgie post-zosteriane.
- Esiti di paresi di origine centrale e periferica (con Rosmarinus off. e Tilia tomentosa).
- Esiti di poliomielite.
- Paralisi ascendente acuta di Landry (con Ginkgo biloba).
- Nevrastenia (con Ficus carica e Tilia tomentosa).
- Nevrosi d'angoscia con attacchi di panico per paura di un pericolo non ben definito (con Tilia tomentosa).
- Nevrosi fobica, (con Tilia tomentosa).
- Rimedio di modificazione e drenaggio in processi degenerativi organici allo stadio iniziale; rimuove le sostanze umorali tossiche.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

AESCULUS HIPPOCASTANUM gemme

INDICAZIONI:

- Sindrome varicosa ed essudativa.
- Stasi venosa periferica, varicosità, varici, tromboflebiti, emorroidi.
- Stasi della vena porta con conseguente congestione epatica dolorosa e turbe dispeptiche con dispepsia acida.
- Stasi pelvica con varicocele, prostatismo, dismenorrea, menometrorraggie.
- Proctite da stasi venosa e da congestione pelvica; proctarragia.
- Varici pelviche.
- Costipazioni croniche con emorroidi brucianti, congeste, bluastre e sanguinanti con senso di peso nell'ano. Le emorroidi sono peggiorate dal calore e dalla sedentarietà, migliorano col freddo e col movimento.
- Trombosi emorroidaria acuta e malattia emorroidaria.
- Algie lombo-sacrali, lombagine, coadiuvante nelle discopatie.
- Algie croniche nella regione lombo-sacrale ed alle articolazioni ileo-sacrali che peggiorano piegandosi in avanti e migliorano con l'esercizio prolungato.
- Faringo-laringite secca e grattante con mucose secche (da dilatazione venosa del plesso venoso faringeo).
- Geloni ed eritema pernio, acrocianosi, eritema passivo e periulceroso.
- Fragilità capillare (angiopsatirosi, angiocapillarite).
- Enfisema (con *Corylus avellana* e *Rubus fruticosus*).
- Insufficienza respiratoria di origine enfisematica (con *Corylus avellana* e *Rubus fruticosus*).
- Traumatismi con esiti flogistici; come antiedemigeno e vasoprotettore.
- Costituzione reumatica.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

ALNUS GLUTINOSA gemme

INDICAZIONI:

- Esiti di processi flogistici che tendono a cronicizzare, come gli esiti di bronchiti, peritoniti, osteomielite, reumatismo articolare, sinusite, ecc.
- "Deficit" cerebrali dell'anziano angiosclerotico.
- Esiti di emorragie cerebrali con o senza rammollimento cerebrale e tutte le malattie cerebrovascolari (TIA, RIND) dei tronchi arteriosi sovraortici a destinazione encefalica; sclerosi cerebrale (con Ginkgo biloba).
- Infarto del miocardio, (da usarsi dopo la seconda settimana; nella prima settimana è più indicato Cornus Sanguinea).
- Coronariti, arteriti e tromboflebiti, angioite.
- Vasculite nodulare (con Betula pubescens e Cercis siliquastrum).
- Insufficienza vascolare arteriosa.
- Aortite (con Cercis siliquastrum e Populus nigra).
- Vasculopatia diabetica (con rimedi complementari!).
- Granulomatosi di Wegener (con Cercis siliquastrum, Ribes nigrum).
- Cefalee vasomotorie e emicranie. Alnus glutinosa gemme in associazione a Ribes nigrum e Mentha aquatica è indicato nel trattamento della cefalea vasomotoria.
- Riniti croniche e sinusite cronica.
- Processi flogistici e suppurativi delle mucose rinosinusale, tracheobronchiale, colecistica e cistopielica, con febbre. Mononucleosi.
- Sinusite acuta e sub-acuta suppurativa, (con Ribes nigrum e Mentha aquatica).
- Costituisce un rimedio di ogni sindrome flogistica mucosale in fase suppurativa acuta: rinite, otite, sinusite, tracheite, bronchite, gas trite, colite, pielite, cistite, colecistite, (con rimedi complementari!) a tendenza diffusiva.
- Ulcera gastro-duodenale, (con Ficus carica).
- Aftosi (stomatite aftosa) gengivostomatite (con Vaccinium myrtillus).
- Varici e Ulcere varicose, flebiti e paraflebiti.
- Edemi arti inferiori e dermatosi eritematose (con Ribes).
- Sindromi venose acute come flebiti e tromboflebiti (agisce da solo) -Sindromi flogistiche sub-acute a tendenza diffusiva, (pleuro polmonite, osteite, osteomielite, peritonite, ecc.).
Sindrome influenzale.
- Danni iatrogeni da farmaci, da alimenti, sostanze conservanti, additivi, piante, ecc. (con Prunus spinosa). Orticaria acuta e cronica.
- Forme asmatiche di tipo allergico (con Ribes e Viburnum).
- E' uno stimolatore della corteccia surreale (come Ribes Nigrum).
- Vertigini su base aterosclerotica (con Ampelopsis e Sequoia).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

ALNUS INCANA gemme

INDICAZIONI:

- Fibromi, Miomi e fibromiomi uterini (con Rubus fruticosus oppure in associazione a Sequoia Gigantea e a Ribes Nigrum).
- Osteoporosi, (con Rubus fruticosus, Sequoia e Vaccinum Vitis idaea).
- Mastopatia fibrocistica, (con Betula verrucosa, Rubus idaeus, Ilex aquifolium, Buxus sempervirens). Mastite, mastodinia.
- Angiomi, emangioma (con Buxus sempervirens).
- Artralgie dovute ad artrosi con componente osteoporotica.
- Galattofugo (arresta la secrezione latte).
- Verrinosi intestinale.
- Ptosi viscerale (con Fraxinus excelsior).
- Prolasso dell'utero. (con Fraxinus excelsior).
- Vene varicose e ulcere varicose (con Aesculus e Sorbus domestica).
- Edemi arti inferiori.
- Emorroidi (con Aesculus).
- Iperidrosi palmo-plantare.
- Cirrosi epatica, (con Corylus avellana e Juniperus communis) (Pommier).
- Flogosi cronica di qualsiasi tessuto che non risponde ad altri trattamenti.
- Neoformazioni cutanee (con Buxus sempervirens).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

AMPELOPSIS VEITCHII giovani getti

INDICAZIONI:

- Reumatismo infiammatorio.
- Reumatismo cronico, Miogelosi.
- Fibroialinosi tissutale, (con Buxus che è il suo complementare Biologico).
- Sindromi reumatiche di tipo flogistico, iperalgiche, rapidamente evolutive e deformanti (Artrosi - Artrite). Miogelosi.
- Artrite reumatoide.
- Artrosi deformante.
- Aderenze post-infiammatorie e indurimenti fibrosi.
- Morbo di Dupuytren, (con Buxus sempervirens e Ribes nigrum).
- Morbo di Ledderhose.
- Malattia di Peyronie, (con Buxus sempervirens calluna e Ribes).
- Periartrite scapolo-omerale (con Buxus sempervirens).
- Dorsalgie (con Pinus montana).
- Vertigini su base arteriosclerotica (con Alnus glutinosa e Sequoia gigantea).
- Poliartrite cronica evolutiva (p.C.E.).
- Spondilite anchilosante.
- Connettiviti autoimmuni e mesenchimopatie (con Buxus).
- Tendiniti e flogosi dei legamenti, (con Fraxinus excelsior e Ribes nigrum).
- Depositi anticorporali.
- Edemi di origine renale.
- Dolori alla colecisti con vomito e diarrea coloriforme.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

BETULA PUBESCENS amenti, gemme, giovani radici, scorza interna di radice

INDICAZIONI:

Amenti:

- Frigidità femminile, (con *Rubus idaeus*).
- Impotenza maschile, (con *Quercus pedunculata*, *fraxinus* e *Sequoia gigantea*), andropausa.
- Diminuzione della libido, (con *Quercus pedunculata*, *Sequoia gigantea* e *Rubus idaeus*).
- Disturbi endocrini.
- Ipotiroidismo lieve (stimolazione tiroidea).
- Obesità.
- Rinofaringiti dell'adulto.
- Ipogonadismo della pubertà femminile, (con *Rubus idaeus*), ritardi del menarca.
- Ipogonadismo della pubertà maschile, (con *Quercus pedunculata*), Astenospermia, azospermia.
- Sterilità maschile, (con *Sequoia gigantea*, *Rubus fruticosus* e *Quercus pedunculata*).
- Sterilità femminile, (con *Rubus idaeus*, *Quercus pedunculata* e *Rosmarinus officinalis*).

Gemme:

- Demineralizzazione e decalcificazione ossea generale, (con *Abies pectinata*).
- Osteoporosi e dismetabolie.
- Turbe dell'accrescimento e della nutrizione, (con *Abies pectinata* e *Prunus spinosa*), dolori di "crescita".
- Inappetenza e anoressia dell'infanzia e dell'adulto.
- Gonartrosi, coxartrosi.
- Rachitismo, (con *Abies pectinata*).
- Tendinite (con *Ampelopsis*).
- Rinofaringiti recidivanti dell'infanzia, (con *Abies pectinata*, *Ribes nigrum* e *Rosa canina*), adenoidite.
- Rinofaringiti dell'adulto, (con *Alnus glutinosa* e *Carpinus betulus*), prevenzione influenza (con *Rosa c.*).
- Sinusiti acute non suppurative (con *Ribes nigrum* e *Alnus glutinosa*).
- Paradontosi (con *Abies pectinata*, *Quercus pedunculata*).
- Piorrea alveolo dentaria, (con *Abies pectinata* e *Quercus pedunculata*), gengivite, gengivostomatite.
- Tónico e stimolante generale nell'astenia psicofisica.
- Ritardi del pubarca e del menarca (con *Prunus spinosa*). - Stipsi (con *Quercus pedunculata*, *Vaccinium vitis idaea*).
- Tromboflebiti, (con *Alnus glutinosa*).
- Nevralgie intercostali, (con *Acer campestre*).
- Cataratta (con *Salix alba* linfa).

Giovani radici:

- Iperazotemia.
- Ipercolesterolemia.
- Iperuricemia, coxartrosi e gonartrosi.
- Diuretico azoturico, uricosurico e declorurante.
- Alopecia.

Scorza interna delle radici:

- Insufficienza renale, (con *Juniperus communis*).
- Insufficienza cardiaca dell'anziano con edemi declivi, (con *Crataegus oxyacantha*).
- Diuretico azoturico, uricosurico e declorurante, (con *Fraxinus excelsior*).
- Albuminuria.
- Ipercreatininemia.- Iperazotemia.
- Iperuricemia.- Ipercolesterolemia.
- Oliguria.
- Idropisia.
- Gotta (con *Fraxinus excelsior*).
- Seborrea del cuoio capelluto (per uso interno ed esterno).
- Calvizie prococe, (per uso interno ed esterno).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

BETULA VERRUCOSA gemme, linfa, semi

INDICAZIONI:

Gemme:

- Catarro delle mucose, (con *Abies pectinata* nelle rinofaringiti recidivanti). Rinite parossistica (con *Ribes* e *Rosa canina*).
- Gastrite catarrale, (con *Ficus carica*).
- Albuminuria ortostatica recidivante.
- Sindromi nefritiche.
Reumatismo dismetabolico.
- Osteocondrite giovanile, rachitismo e osteomielite cronica.
- Carie dentaria infantile, carenze minerali, (ha una spiccata azione osteoplastica con *Abies pectinata*).
- Malattia di Scheuermann (in associazione a *Abies pectinata*) o Epifisite vertebrale.
- Mastopatia fibrocistica o iperplasia fibroadenomatosa del seno ad evoluzione benigna, (associare con *Rubus idaeus*, *Ilex aquifolium* e *Alnus incana*).
- Ingorgo dei gangli linfatici e adenopatie, (con *Juglans regia*).

Linfa:

- Litasi renale.
- Cistite cronica.
- Artrosi e Reumatismo cronico degenerativo.
- Reumatismo muscolare e articolare con tendenza alla calcificazione.
- Peri artrite scapolo-omerale (con *Ampelopsis* e *Viscum album*).
- Mesenchimopatie (con *Ampelopsis veitchii*).
- Oliguria, albuminuria. Linfedema (con *Castanea*).
- Idropisia e sindrome cardio-renale (con *Prunus spinosa*).
- Iperuricemia e Gotta. Obesità (con *Fagus sylvatica*).
- Ipercolesterolemia.
- Cellulite e pannicoliti dolorose, dermo-ipodermosi cellulitica.
- Afta e stornati ti aftose (uso locale).
- Calvizie precoce (uso locale e generale).
- Pelli anelastiche facilmente soggette a smagliature ed inestetismi, (con *Platanus orientalis*).
- Gastrite e catarrhi delle mucose in generale (H. Reckeweg).
- Dermatosi.

Semi:

- Si sono rivelati ottimi come tonici del sistema nervoso, particolarmente idonei agli studenti in periodo di esami e come stimolanti generali.
- Neurastenia da "surmenage" intellettuale (tonico nervino).
- Difficoltà di concentrazione e perdita di memoria (con *Prunus amygdalus*).
- Astenia mentale dell'anziano (associato ad *Alnus glutinosa*).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

BUXUS SEMPERVIRENS giovani getti

INDICAZIONI:

- Artrite reumatoide (con Ampelopsis veitchii).
- Aderenze post-infiammatorie di qualsiasi tipo (con Alnus glutinosa) -Morbo di Dupuytren (con Ampelopsis veitchii e Ribes nigrum).
- Morbo di Peyronie (con Ampelopsis veitchii, calluna e Ribes).
- Morbo di Ledderhose (con Ampelopsis veitchii e Calluna vulgaris).
- Ittero, Colangite.
- Insufficienza biliare (con Rosmarinus officinalis), colecistite.
- Reumatismi cronici, miogelosi (con Ampelopsis), periartrite.
- Gotta e iperuricemia (con Fraxinus excelsior).
- Dislipidemie, turbe minori della coagulazione e piastrinosi.
- Mesenchimopatie (con Ampelopsis).
- Sindromi discrasiche con alterazioni sanguigne, sindrome leucemica.
- Seborrea grassa del cuoio capelluto e della cute (con Betula).
- Piaghe atone e infette, verruche (con Juglans regia).
- Eczema pustoloso palmo-plantare (con Ulmus Campestris).
- Esiti di sifilide.
- Epilessia.
- Verminosi intestinale (con Alnus incana e Juglans regia).
- Odontalgie da carie e radicolite dentale, (uso locale e generale).
- Candidosi orale (con Rubus fruticosus).
- Linfadenomegalie croniche (con Juglans regia e Vitis vinifera).
- Sindromi da iper-alfa-due globulinemia.
- Cancerinismo e fasi preneoplastiche (diatesi neoplastica).
- Analgesia oncologica (cancro del fegato e dello stomaco).
- Analgesia oncologica in caso di metastasi.
- Emangioma e neoformazioni cutanee (con Alnus incana).
- Fibroadenomi mammari (noduli al seno), e cisti ovariche.
- Carcinoma midollare, carcinoma scirroso.
- Adenocarcinoma cistico papillifero (con Viscum album).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

CALLUNA VULGARIS giovani getti

INDICAZIONI:

- Processi degenerativi di tipo ialino ed amiloideo e ogni affezione in via di degenerazione amiloide a carico del cervello, fegato, milza, mucose digestive, rene (nefroamilosi), ghiandole endocrine.
- Osteomielite cronica tubercolare fibrosa;
- Pielonefrite cronica;
- Poliartrite reumatoide (Pol Renry).
- Malattie caratterizzate a processi di suppurazione recidivante e prolungata.
- Cistiti acute e recidi vanti, Cistopieliti acute e croniche, Colibacillosi, Prostatiti acute e croniche, Uretriti, Cistiti dei prostatici, disuria, piuria.
- Calcolosi delle vie urinarie.
- Litiasi renale ossalocalcica, (con Juniperus Communis).
- Splenite e Splenomegalia (con Tamarix gallica).
- Sclerosi dei corpi cavernosi (M. di Peyronie) con Ampelopsis, Buxus e Ribes in alternanza.
- Cistiti dei prostatici.
- Diarrea.
- Leucorree (per uso interno con Alnus glutinosa e Juglans regia).
- In via sperimentale nelle arteriopatie obliteranti degli arti inferiori e nei processi infiammatori e degenerativi a carico del distretto circolatorio arterioso.
- Lentigo senilis; per uso interno ed esterno (mediante tocature).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

CARPINUS BETULUS gemme

INDICAZIONI:

- Disglobulinemia: produzione di proteine patologiche, (con Vaccinum vitis idaea a Viburnum lantana) - (T. Swenson).
- Gammopatie monoclonali benigne; da associare ai rimedi delle sindromi iper-alfa-uno, iper-alfa-due e gammaglobuliniche a seconda del quadro clinico, (con Cornus sanguinea, Juglans regia, Betula pubescens, Betula verrucosa, Ulmus campestris, Juniperus communis ecc.).
- Mieloma (Plasmocitoma) come coadiuvante con le stesse associazioni gemmoterapiche delle Gammopatie monoclonali benigne.
- Ipergamma globulinemia (con Cornus sanguinea, Juglans regia e Juniperus communis).
- Insufficienza epatica con iper-gamma-globulinemia e piastrinopenia.
- Piastrinopenia jatrogena (post-medicamentosa).
- Piastrinopenia acquisita da auto-immunizzazione ed immuno allergica da farmaci.
- Piastrinopenia da anticoagulanti, (con Cornus sanguinea).
- Sindrome emorragica da anticoagulanti, (con Cornus sanguinea).
- Intossicazione da anticoagulanti.
- Piastrinopenia post -splenectomia.
- Periartrite nodosa post-medicamentosa (Pol Henry).
- Rinofaringiti recidivanti, (con Betula pubescens).
- Rinofaringiti dell'adulto, (con Betula pubescens amenti e gemme).
- Sindromi rino-sinuso-bronchiali, (con Ribes nigrum e Alnus glutinosa).
- Rino-faringo-tracheiti recidivanti e spasmodiche, (con Ribes nigrum e Viburnum lantana).
- Sinusiti croniche, (con Alnus Glutinosa).
- Bronchite acuta (con Lonicera nigra), bronchite cronica (con Fagus).
- Tosse spasmodica.
- Sindromi respiratorie spasmodiche e tussigene, (con Viburnum lantana).
- Sindromi polmonari complicate (con Corylus avellana e Viburnum lantana).
- Colon irritabile e colite mucosa con prevalente componente diarroica e mucosa: riduce gli spasmi della muscolatura liscia del colon e nel con tempo esplica azione antinfiammatoria sulle mucose coliche, (con Ficus carica e Castanea vesca).
- Aborto abituale.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

CASTANEA VESCA gemme

INDICAZIONI:

- Stasi linfatica arti inferiori, (con Sorbus domestica soprattutto quando il rallentamento della circolazione è dovuto a iperviscosità ematica e ad insufficienza venosa).
- Edemi di natura linfatica, (con Sorbus domestica e Lonicera nigra).
- Edemi declivi in corso di terapia estroprogestinica (con Citrus limonum e Sorbus domestica).
- Sindromi da insufficienza venosa degli arti inferiori come varici, varicosità, tromboflebiti, edemi declivi, (con Sorbus e Aesculus Hippocastanum).
- Emorroidi (con Aesculus hippocastanum).
- Esiti di tromboflebiti, (con Alnus glutinosa e Sorbus domestica).
- Ulcere e ferite a cicatrizzazione torpida: facilita la cicatrizzazione lenta di ferite o ulcere agli arti inferiori da malattia post-flebitica.
- Crampi al polpaccio in donne affette da stasi linfatica e venosa agli arti inferiori, (con Citrus limonum).
- Turbe della circolazione linfatica e venosa degli arti inferiori e come coadiuvante nell'infedema del braccio da svuotamento ascellare post-mastectomia.
- Eritema eczematoso periulceroso degli arti inferiori, (con Juglans regia e Aesculus Hippocastanum).
- Angiocapillarite sottocutanea, (con Aesculus hippocastanum).
- Cellulite (con Betula verrucosa linfa, Ligustrum vulgare).
- Fragilità dei vasi capillari, (con Aesculus hippocastanum).
- Dismenorrea spasmodica, (con Rubus idaeus e/o Tilia tomentosa e/o Rosmarinus e/o Salix alba amenti).
- Disturbi venosi della menopausa.
- Cefalea congestizia da menopausa (con Sorbus domestica).
- Parestesie delle estremità (con Sorbus domestica).
- Fenomeni congestivi da autointossicazione (T. Swenson).
- Colite e Rettocolite ulcerosa con dolore spasmodico del colon discendente e sensibilità dolorosa della parete addominale e scariche diarroico-mucose e sanguinolente. In questi casi (oltre ai normali presidi terapeutici spesso necessari), l'associazione Castanea vesca + Carpinus betulus permette di ridurre la stasi linfatica della pelvi e dei plessi colici, di prevenire ed evitare possibili ulcerazioni della mucosa colica.
- Tosse spasmodica con congestione nasale, che peggiora la notte, con bevande fredde e migliora con bevande calde, (con Carpinus betulus).
- Pertosse (con Carpinus betulus e Viburnum lantana).
- Coadiuvante nel trattamento contro la caduta dei capelli.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

CEDRUS LIBANI giovani getti

INDICAZIONI:

- Dermatose croniche ribelli e discrasie cutanee.
- Stasi delle ghiandole sebacee e sudoripare.
- Dermatose cheratosiche ed ipercheratosiche.
- Dermatose ed eczemi pruriginosi con cute secca.
- Dermatose lichenificate.
- Eczema "secco".
- Eczema cheratosico.
- Eczema cheratosico superinfettato, (con *Juglans regia*).
- Calli, callosità, duri e "occhio di pernice".
- Ittiosi.
- Cheratosi senile.
- Psoriasi.
- Pelle inaridita o disidratata.
- Disidratazione cutanea da radiazioni solari.
- Prurigo senilis in cute secca e mal vascolarizzata.
- Dermatite atopica ed eczema atopico, (con *Ribes nigrum*).
- Neurodermite, (con *Ribes nigrum*).
- Dermatite seborroica del bambino, crosta latte (Lattime).
- Eritrodermia desquamativa di Leiner-Moussous.
- Dermatite seborroica dell' adulto.
- Disidrosi palmo-plantare o Pompholyx.
- Cheratosi attiniche (contadini e marinai) o da idrocarburi, arsenicali, ecc.
- Cheratodermie Palmo-plantari.
- Sindrome da intossicazione cronica con variazione cutanea.
- Sindrome allergica con manifestazione cutanea e/o mucosa. -Sindrome da irritazione mucosale digestiva e respiratoria.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

CERCIS SILIQUASTRUM gemme

INDICAZIONI:

- Manifestazioni trombofiliche o rischio di trombosi con segni di trombofilia ematica: alterazione del tempo di coagulazione, alterazioni del tromboelastogramma, (con Cornus sanguinea e Citrus limonum).
- Arteriopatia aterosclerotica obliterante, (con aumento delle beta globuline e pre-beta-globuline, ipercolesterolemia e segni di trombofilia ematica, (con Olea europaea, Cornus sanguinea, Prunus amygdalus).
- Cerebropatia vascolare, (con Citrus limonum, Alnus glutinosa, Ginkgo biloba e Prunus amygdalus).
- Malattia di Btierreger o Tromboangioite obliterante in cui è sempre presente aumento prevalente delle alfa-globuline, disprotidemia con alterazione del rapporto albumina/globulina, alterazioni dell'immunolettroforesi e aumento della VES (con Ribes nigrum e Cornus sanguinea).
- Malattia di Takayasu o Arteriopatia infiammatoria delle donne giovani o malattia senza polsi (con Ribes nigrum e Cornus sanguinea).
- Sindrome di Lériche (Claudicatio intermittens + impotenza + astenia e atrofia arti inferiori (con Citrus limonum, Cornus sanguinea).
- Angina abdominis da aterosclerosi dell'arteria mesenterica, (con Cornus sanguinea, Olea europaea e Citrus limonum).
- Vasculite nodulare, (con Betula pubescens e Alnus glutinosa).
- Arterite temporale di Horton e Arterite a cellule giganti (con Cornus sanguinea e Ribes nigrum).
- Poliarterite nodosa, (con Ribes nigrum, Cornus sanguinea e Citrus limonum) - Angioite allergica, (con Ribes nigrum e Alnus glutinosa).
- Granulomatosi di Wegener, (con Ribes nigrum e Alnus glutinosa) come coadiuvante ai trattamenti classici.
- Angioite granulomatosa allergica, (con Ribes nigrum e Alnus).
- Arteriopatia agli arti inferiori del tabagico displipidemico, (con Populus nigra Cornus sanguinea).
- Trombosi retinica, (in fase precoce con Cornus sanguinea).
- Arteriopatia retinica, (con Cornus sanguinea o Olea europaea).
- Embolia arteriolare retinica, (con Alnus glutinosa).
- Esiti di Trombosi retinica, (con Alnus glutinosa).
- Arterite trombotica, (con Populus nigra, Alnus glutinosa e Betula pubescens).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

CITRUS LIMONUM scorza di giovane ramo, gemme

INDICAZIONI:

Scorza di giovane ramo:

- Manifestazioni tromboemboliche in qualsiasi distretto dell' organismo, (con Cornus sanguinea e Prunus amygdalus).
- Sindromi ipercoagulative da iperfibrinogenemia, (associato a Cornus sanguinea e Prunus amygdalus, normalizza fattori della coagulazione alterati, riducendo il rischio trombotico).
- Varici e insufficienza venosa; per ridurre il rischio di tromboflebiti, (con Sorbus domestica e Castanea Vesca).
- Malattia post-flebitica, (con Castanea vesca e Sorbus domestica).
- Aterosclerosi complicata da fenomeni di trombofilia (iperfibrinogenemia) o aggravata da fattori di rischio trombotico come diabete, alterazione del ricambio lipidico, ipertensione, arteriopatie, tabagismo e vita sedentaria.
- Aterosclerosi carotidea, (con Alnus glutinosa, Olea europaea, Cornus sanguinea, Ginkgo biloba).
- Attacchi ischemici transitori cerebrali (T.L.A.), (con Cornus sanguinea).
- Esiti di "ictus cerebri" o infarto cerebrale, (con Alnus glutinosa, Prunus amygdalus, Acer campestre e Ginkgo biloba).
- Arteriti a rischio tromboembolico, (con Cercis siliquastrum e Cornus sanguinea).
- Trombosi della retina, (con Cercis siliquastrum e Cornus sanguinea; nei casi di esiti con Cercis siliquastrum e Alnus glutinosa).
- Miocardioangiosclerosi con insufficienza coronarica, (con Syringa vulgaris e Crataegus oxyacantha).
- Arteriosclerosi cerebrale, (con Alnus glutinosa e Olea europaea).
- Insufficienza cardiaca dell'anziano e/o iperteso, (con Crataegus e Betula pubescens scorza interna di radice).
- Esiti di infarto miocardico: (Zea mays e Citrus limonum per accelerare la cicatrizzazione del miocardio; poi Alnus glutinosa e Citrus limonum. Nella fase acuta o subacuta, durante la prima settimana, è più indicato Cornus sanguinea).
- Angina pectoris, (con Syringa vulgaris e Cornus sanguinea).
- In qualsiasi condizione morbosa a rischio trombotico. In tali casi l'associazione di Citrus limonum + Cornus sanguinea + Prunus amygdalus, consente di normalizzare i fattori della coagulazione, di rendere più fluido il sangue, di correggere una quota displipidemica e ridurre così notevolmente il rischio trombotico).
- Vizi valvolari cardiaci in cui è necessario ottenere una maggior fluidità e una ipofibrinogenemia ematica.
- Stati pletorici e dismetabolie; piastrosi.
- Policitemia idiopatica o Malattia di Vaquez-Osler, (con Cornus sanguinea e Prunus amygdalus) -Crampi muscolari recidivanti.
- Coadiuvante nelle diete dimagranti, facilita l'eliminazione di liquidi e lipidi dall' organismo, proteggendo da eccessivo rilassamento cutaneo.

Gemme:

- Turbe dispeptiche (con Ficus carica).
- Cefalee digestive.
- Vomito e iperacidità gastrica (con Ficus carica).
- Intossicazioni da farmaci, alimenti e alcoolici.
- Calcolosi biliare.
- Calcolosi renale.
- Dismetabolie (gota, diabete).
- Ipercolesterolemia.
- Regolatrici del metabolismo basale e dell'equilibrio acido-basico.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

CORNUS SANGUINEA gemme

INDICAZIONI:

- Tutti gli stati trombotici acuti con necrosi tissutale acuta e subacuta - Infarto di qualsiasi tessuto, specialmente del miocardio.
- Preventivo delle situazioni pre-infartuali o dell'infarto in via di formazione: risolve l'infarto neoformato o piccole zone infartuali, ma è indicato solo nella prima fase invasiva dell'infarto cardiaco perché la sua azione è rapida e fugace; inoltre il suo complementare (*Alnus glutinosa*), costituisce il rimedio migliore per i postumi dell'infarto.
- Coronarite trombotica: scioglie i microtrombi in formazione ed impedisce l'occlusione delle coronarie, (con *Crataegus oxyacantha*) (P. Henry).
- Infarto miocardico in fase acuta: rimedio da prescrivere solo nella prima settimana: induce una diminuzione degli enzimi glutammico-transaminasi e della lattico-dei-drogenasi: in seguito è indicato *Alnus glutinosa*, che è più idoneo per gli esiti infartuali.
- Stati di trombofilia a rischio trombotico, (con *Citrus limonum* e *Prunus amygdalus* riduce i fattori della coagulazione e diminuisce il rischio trombotico).
- Iperfibrinogenemia, poliglobulia (con *Citrus limonum*).
- Alterazioni della crasi ematica contraddistinta da aumentata resistenza al test dell'eparina (con *Citrus limonum* e *Prunus amygdalus* corteccia interna di radice).
- Affezioni infiammatorie sub-acute e necrotiche.
- Arteriti (con *Cercis siliquastrum*, *Citrus limonum* e *Populus nigra*).
- Cuore senile, (con *Crataegus oxyacantha*).
- Arterite e arteriopatie degli arti inferiori, (con *Populus nigra*).
- Morbo di Bierger, (con *Cercis siliquastrum*, *Ginkgo biloba* e *Populus*).
- Arterite temporale di Horton, (con *Cercis siliquastrum* e *Ribes nigrum*).
- Arterite aterosclerotica, ateromatosi carotidea (con *Citrus* e *Ginkgo*).
- Arterite tabagica, Poliarterite nodosa (con *Cercis siliquastrum*).
- Traumatismi chiusi del torace con frattura pluricostale e con emopneumotorace soffocante. (Pol Henry).
- Emorragie endocraniche, toraciche e addominali post-traumatiche, non risolvibili chirurgicamente. (Pol Henry).
- Morbo di Basedow. Eccellente rimedio dell'ipertiroidismo con segni di tireotossicosi come: dimagrimento, tachicardia, tremori, termofobia, esoftalmo, iperemotività, irritabilità, tremori fini alle estremità e diarrea, (con *Viburnum lantana*). - (Pol Henry).
- Gozzo vascolare moderato e diffuso.
- Gozzo semplice eutiroideo, (con *Rosa canina*) (P. Henry).
- Complicazioni oculari della tireotossicosi: Esoftalmo (con *Viburnum*).
- Complicazioni cardiache della tireotossicosi (alternandolo a *Crataegus oxyacantha* e a *Viburnum lantana*).
- Nevralgie brachiali e intercostali (con *Acer campestre*).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

CORYLUS AVELLANA gemme

INDICAZIONI:

- Inibisce la sclerosi del tessuto connettivo del polmone ristabilendone l'elasticità (con *Rubus fruticosus*).
- Bronchiti croniche complicate (con *Viburnum lantana* e *Ribes nigrum*) -Enfisema polmonare, (con *Rubus fruticosus*).
- Asma complicata da enfisema, (con *Viburnum lantana* e *Ribes nigrum*).
- Sclerosi del parenchima polmonare, (con *Rubus fruticosus*).
- Inibisce la sclerosi progressiva del parenchima epatico (con *Alnus incana*).
- Insufficienza epatica, (con *Rosmarinus officinalis*).
- Epatite virale (con *Zea mays*).
- Epatopatia cronica, (con *Rosmarinus officinalis*, *Secale cereale* e *Juniperus*).
- Esiti post-epatitici non aggressivi.
- Cirrosi epatica, (con *Juniperus communis*, *Rosmarinus off.* e *Secale cereale*).
- Epatopatia alcoolica non ascitica.
- Antisclerotico: nell'insufficienza arteriosa degli arti inferiori da arteriosclerosi, (con *Populus nigra* e *Cercis siliquastrum*).
- Arteriti degli arti inferiori che possono evolvere sino alla gangrena senile localizzata. (Pol Henry).
- Antianemico: anemia ipocromica, microcitica, specie se da perdita e stillicidio in seguito a gastriti, ulcera, affezioni digestive, a stato diarroico o sanguinamento emorroidale (con *Tamarix gallica*).
- Nevrosi delle estremità (Restless syndrom), soprattutto in arteriopatici.
- Squilibri neurovegetativi, (con *Ficus carica*).
- Se associato alle foglie in 1 DR, il gemmoterapico agisce anche nella stasi circolatoria, nella stasi polmonare, nell' edema degli arti inferiori, nelle ulcere varicose e nelle ulcere necrotiche. (Pol Henry).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

CRATAEGUS OXYACANTHA giovani getti

INDICAZIONI:

- Sindrome neurocardiaca con ansietà precordiale "sine materia" a tipo angina toracica. La sua azione si fa notare sulla fase di riposo l'arizzazione dell'elettrocardiogramma dove corregge gli slivellamenti del tratto ST.
- Ipertensione arteriosa, con alterazioni della frequenza cardiaca, (con *Olea europaea*).
- Cuore senile con leggera ipertensione senile.
- Cuore senile che non richiede ancora la digitale.
- Cuore adiposo.
- Alterazioni della frequenza cardiaca: tachiaritmie.
- Alterazioni del ritmo cardiaco: aritmia extrasistolica, palpitazioni, ecc. (con *Tilia tomentosa*).
- Forme lievi di disturbi bradicardici del ritmo cardiaco.
- Forme lievi di extrasistolia ventricolare con ritmo di base bradicardico.
- Senso di angoscia e oppressione nella regione cardiaca.
- Angina pectoris (stadi I e II), precordialgie e disturbi nervoso-funzionali pectanginosi, (con *Cornus sanguinea* *Tilia tomentosa*). L'azione sull'E.C.G. è notevolmente rafforzata da *Cornus sanguinea* che protegge il miocardio nel caso in cui vi sia tendenza infartuale.
- Insufficienza cardiaca iniziale (con *Betula pubescens* scorza di radice).
- Insufficienza cardiaca post-infettiva (H. Reckeweg).
- Miocardioangiosclerosi e cuore senile, (con *Cornus sanguinea*).
- Stadi iniziali dell'insufficienza del cuore sinistro.
- Forme leggere di insufficienza da sovraccarico del cuore destro.
- Decrescente capacità di prestazione cardiaca corrispondente agli stadi I-II di Nyha.
- Sequele dell'infarto miocardico, (con *Zea mays*).
- Fibrosi del miocardio.
- Sclerosi coronarica.
- Miocardite, miocardiosi, endocardite.
- Cardioeretismo a base ansiosa o basedowiana, (con *Tilia tomentosa*, *Cornus sanguinea* e *Viburnum lantana*).
- Ansietà, (con *Tilia tomentosa*).
- Insonnia con eretismo cardiaco, (con *Tilia tomentosa*).
- Insonnia del cardiopatico.
- Asma con dispnea continua di tipo intrinseco non allergica (con *Viburnum lantana*).
- Per sostenere il circolo sanguigno di cardiopatici nelle affezioni febbrili.
- Disturbi della menopausa: palpitazioni, insonnia, acufeni e vertigini.
- Disturbi circolatori da obesità.
- Secondo Pol Henry, se associato alle sommità fiorite (1 DH), il germoglio di Biancospino agisce molto bene e per lungo tempo nelle malattie degenerative e nel cuore senile.
- Attività citostimolante generale (Klatt).
- Favorisce la longevità.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

FAGUS SYLVATICA gemme

INDICAZIONI:

- Ipogammaglobulinemia post-lesionale da fibrosclerosi post-infiammatoria e da disfunzione neurogena.
 - Ipogammaglobulinemia infantile post-infettiva: nei bambini che dopo un'infezione risultano affetti da deficit delle immunoglobuline e per questa ragione sono sensibilizzati ad affezioni ricorrenti, (con Rosa canina).
 - Ipogammaglobulinemia da depressione immunologica.
 - Ipogammaglobulinemia secondaria a disturbi psichici, secondari a shok emotivo violento dal quale il paziente stenta a riprendersi (Pol Henry).
 - Ipogammaglobulinemia in caso di infezioni recidivanti (con Rosa canina).
 - Plasmocitosi (non del tipo gamma).
 - Ipogammaglobulinemia da steatorrea.
 - Ipogammaglobulinemia da prolungato trattamento con corticosteroidi o con ACTH.
 - Ipoalbuminemia per danni da Raggi Roentgen.
 - Ipoalbuminemia da amiloidosi.
 - Ipoalbuminemia da nefrite cronica con screzio nefrosico.
 - Ipoalbuminemia da nefrosi amiloidea, (con Calluna vulgaris).
 - Ipoalbuminemia da sindrome nefrosica.
 - Allergie: frena la degranolazione mastocitaria riducendo la liberazione di istamina, (con Ribes nigrum e Betula pubescens).
 - Insufficienza renale iniziale da nefroangiosclerosi, (con Betula linfa, Fraxinus, Juniperus e Rubus fruticosus).
 - Obesità da ritenzione idrica e sovraccarichi ponderali, (con Betula pubescens amenti).
- Cellulite.
- Enfisema polmonare.
 - Fibrosclerosi polmonare (con Corylus avellana e Rubus fruticosus).
 - Nefroangiosclerosi, (con Ilex aquifolium).
 - Litiasi renale.
 - Nefrite, cistopielite.
 - Ateromatosi a predominanza fibrosclerotica, (con Betula pubescens).
 - Oliguria ed edemi da eccessivo trattenimento di liquidi.
 - Drenante renale nelle dismetabolie.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

FICUS CARICA gemme

INDICAZIONI:

- Regolatore dell'asse cortico-ipotalmico; disritmia.
- Turbe neurovegetative e psicosomatiche o di origine funzionale a livello del tratto gastro-duodeno-colico.
- Turbe dispeptiche funzionali associate a meteorismo, (con Vaccinum vitis idaea), aerofagia, aerocolia.
- Vomito (con Citrus limonum gemme).
- Disfagia esofagea con turbe della motilità per acalasia.
- Gastroduodeniti e sintomi ad esse correlati, (dispepsia, pirosi, ecc.).
- Turbe della secrezione gastrica sia "ipo" che "iper".
- Gastrite cronica con anemia sideropenica.
- Ulcera duodenale.
- Ulcera gastroduodenale recidivante a lenta cicatrizzazione; azione cicatrizzante sulle mucose gastriche e duodenali, (con Alnus glutinosa e Vaccinium myrtillus).
- Disfagie esofagee ed ernie diaframmatiche da alterata motilità.
- Coliti e sigmoiditi.
- Morbo di Crohn o ileite terminale, (con Rubus fruticosus e Ribes e Vitis).
- Emorragie del colon sigmoideo, (con Corylus avellana).
- In corso di riduzione da ranitidina, cimetidina, famotidina e sonniferi.
- Verruche, (con Vitis vinifera e Rosa canina).
- Callosità, (con Cedrus libani).
- Sovraccarichi ponderali, per riequilibrare l'asse diencefalico in caso di iperfagia e obesità.
- Spasmodifilia, (con Abies e Tilia).
- Poliartrite dell'adolescente (con Ampelopsis) - (Pol Henry).
- Depressione e neuroastenia, (con Betula semi).
- Nevrosi con spunti fobici-ossessivi.
- Insonnia del nevrotico o da turbe neurovegetative, (con Tilia).
- Nevralgia facciale, (con Olea europaea).
- Suppurazioni superficiali come ascessi, foruncoli, paterecci, acne, sinusiti, ecc. di cui favorisce la suppurazione stimolando la granulocitosi neutrofila.
- Sciatica e ischialgie (con Acer campestre).
- Amenorrea funzionale, (con Rubus idaeus).
- Oligospermia (con Quercus pedunculata amenti).
- Oligoastenospermia dell'adulto, (con Quercus pedunculata e Sequoia) -Sterilità maschile (con Betula pub. amenti, Quercus pedunculata e Sequoia).
- Astenospermia e Azospermia giovanile, (con Quercus pedunculata gemme e Betula pubescens amenti).
- Sterilità femminile (con Salix alba amenti, Rubus idaeus e Viburnum).
- "Surmenage" o stress con somatizzazione viscerale.
- Ematomi post-traumatici (con Cornus sanguinea), sindromi post-traumatiche (cefalea, vertigini, astenia).
- Esiti di ematomi intracranici post-traumatici -Sindrome soggettiva del traumatizzato cranico; cefalee, sensazione di "testa vuota", astenia, ecc. (con Acer campestre).
- Allergie solari, (con Ribes nigrum).
- Allergie mucosali ipoplasiche.
- Granuloma eosinofilo, (con Tamarix gallica: Pol Henry).
- Calazio, (con Platanus orientalis).
- Epilessia focale post-traumatica (con Viscum album).
- Assenze con perdita di coscienza (con Ilex aquifolium).
- Crisi motorie, crisi di Bravais - Jackson, (con Viscum album).
- Crisi sensitive-sensoriali che iniziano all'estremità di un arto che si limitano o che si estendono gradualmente.
- Crisi sensoriali luminose elementari, allucinazioni sonore, olfattive e gustative o con vertigini.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

FRAXINUS EXCELSIOR gemme, semi

INDICAZIONI:

Le gemme:

- Drenante articolare, biliare e renale.
- Iperuricemia e turbe del catabolismo delle nucleoproteine, (complementare di Alnus e Ribes).
- Gotta acuta e cronica.
- Ipercolesterolemia.
- Rigidità articolare.
- Ingorgo epatico e biliare.
- Artrite gottosa.
- Insufficienza renale lieve con oliguria, (con Juniperus communis e Betula pubescens scorza interna di radice).
- Calcolosi colecistica colesterinica (con Acer campestre e Rosmarinus) sia biliare che renale.
- Discinesie biliari e colecistiti, (con Acer campestre).
- Artrosi con iperuricemia, (Fraxinus excelsior possiede anche azione anti-infiammatoria legamentosa e sinoviale), (con linfa di Betula, Vitis vinifera, Ribes nigrum e Pinus).
- Tendiniti e flogosi dei legamenti (con Ampelopsis) e delle sinovie.
- Nevrosi d'angoscia con sensazione di imminente pericolo indefinito, (con Tilia) consigliato da Max Tétau.
- Sovraccarichi ponderali con ipercolesterolemia (con Rosmarinus, Betula amenti e Juniperus) svolge azione diuretica e ipocolesterolemizzante.
- Cellulite e pannicolite dolorosa (con linfa di Betulla).
- Alterazioni del catabolismo necleoproteico, (con Alnus glutinosa e Ribes).
- Obesità con ritenzione idrica.
- Fibromatosi dell'utero (con Sequoia gigantea).
- Prolasso dell'utero e anale; ptosi viscerale.
- Retinite (con Ribes nigrum e Vaccinium myrtillus).
- Retinite pigmentaria (con Ribes e Vaccinium myrtillus).
- Retinopatia alba (con Vaccinium myrtillus).
- Retinopatia senile (con Ginkgo biloba e Vaccinium myrtillus).
- Uveite (con Salix alba linfa e Vaccinium myrtillus).
- Sordità di origine gottosa (Dott. Chargé).
- Nevrosi d'angoscia, (con Tilia tomentosa).
- Antiartritico e antalgico soprattutto se il gemmoderivato è associato alla foglia I DH.
- Antisenescente (con Quercus pedunculata e Sequoia gigantea), tonico.

I semi:

- Turbe della libido maschile.
- Impotenza (con Ginkgo biloba, Betula pubescens, Quercus pedunculata, Sequoia gigantea).
- Anafrodisia e astenia sessuale.
- Azospermia, astenospermia.
- Ipogonadismo maschile.
- Insufficienza testicolare (con Betula pubescens e Quercus pedunculata).
- Senescenza sessuale maschile.
- Sterilità maschile (con Betula pubescens, Ficus carica, Sequoia gigantea).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

ILEX AQUIFOLIUM giovani getti

INDICAZIONI:

- Insufficienza renale da nefroangiosclerosi, (con *Fagus sylvatica*), (P. Henry).
- Mastopatia fibroadenocistica e adenomatosa della mammella ad evoluzione benigna, (con *Betula verrucosa* e *Rubus idaeus*), (Pol Henry).
- Epilessia piccolo male, (con *Tilia tomentosa*), (Pol Henry).
- Coliche gastroenteriche.
- Diarrea mucosa (con *Carpinus betulus* e *Castanea vesca*).
- Psilosi o caduta dei capelli in casi di sprue.
- Lieve insufficienza surrenalica (con *Ribes nigrum*).
- Itterizia, (Haller).
- Postumi di febbri intermittenti e Malaria.
- Congiuntivite con dolori urenti alle orbite (che peggiorano di notte tra le ore 4 e le ore 6).
- Stafiloma della cornea di origine reumatica (Hendricks).
- Dolori alla milza che migliorano in inverno, (Cooper).
- Infiammazione reumatica degli occhi, (con *Salix alba* linfa).
- Irritazione dell'uretra con costante scolo di natura prostatica, (Cooper).
- Acufeni (con *Sorbus domestica*), Tinnitus.
- Ipoacusia e sordità da timpanosclerosi, (con *Alnus glutinosa*, *Sorbus domestica* e *Viburnum lantana*).
- Diatesi reumatica e gottosa.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

JUGLANS REGIA gemme

INDICAZIONI:

- Sindromi da ipergammaglobulinemia.
- Flogosi croniche e suppurazioni croniche delle mucose respiratorie, urologiche, dermatologiche e otorinolaringologiche, bronchite cronica non ostruttiva, pielonefrite cronica, cistite cronica, prostatite cronica, pustolosi non follicolare, impetigine, salpingo metrite non gonococcica e non tubercolare, otiti croniche suppurate, antrace, ascesso, patereccio, ecc.
- Collagenosi (con Ampelopsis, Betula linfa, Buxus e V. myrtillus).
- Affezioni della milza (con Lonicera e Tamarix gallica). Mononucleosi.
- Affezioni epatiche, colecistiche e del dotto biliare con cefalea occipitale.
- Pancreatopatie croniche e postumi di pancreatite acuta emorragica.
- Sindromi da malassorbimento da insufficienza pancreatica funzionale (stimola la secrezione dei succhi pancreatici).
- Lichen. (E.G. Jones).
- Dermatosi pustolose, dermatiti infette, dermatite seborroica.
- Eczema cheratosico superinfettivo, (con Cedrus Libani).
- Acne rosacea con comedoni.
- Acne pustolosa e foruncolosi complicate da stafilococchi e streptococchi.
- Pemfigo.
- Psoriasi (con Cedrus libani e Secale cereale).
- Tigna favosa (Farrington). Micosi.
- Herpes (con Acer campestre, Ulmus, rosa canina).
- Eczema umido (con Ulmus campestris).
- Eczemi infetti, eczemi impetiginizzati, impetigini, piodermiti e tutte le eruzioni impetiginose (con Ulmus campestris).
- Crosta latteia (con Cedrus libani).
- Eruzioni delle cavità ascellari.
- Ulcera varicosa torpida, (con Sorbus domestica e Castanea vesca).
- Piaghe atone, piaghe icorose e infette (con Buxus).
- Callosità infettate e macerate.
- "Occhio di pernice", (con Cedrus libani). verruche (Ficus e Vitis).
- Meteorismo addominale, flatulenze e distensione addominale: con azione ripristinante la flora batterica intestinale. Disbiosi intestinale.
- Diarrea secondaria ad uso di antibiotici (con Vaccinium vitis idaea).
- Diabete florido (con Morus nigra) e sue complicanze.
- Bronchiti croniche e suppurazioni croniche mucosali. -Linfatismo e diatesi linfatica; Adenoidite, Parotite.
- Scrofulosi. Tonsilliti recidivanti (con Vitis vinifera).
- Coadiuvante nei linfomi, linfogranulomi e mielomi.
- Adenite ascellare suppurata o tendente alla suppurazione.
- Idrosadenite ascellare suppurata o tendente alla suppurazione, (con Ulmus campestris).
- Linfoadenomegalie (con Buxus e Vitis).
- Blefarite acuta e cronica.
- Idrargirismo mascellare. Granuloma dentale.
- Iperidrosi (con Alnus incana, Ulmus campestris e Salix alba scorza di stelo).
- Leucorree (Alnus glutinosa - Calluna vulgaris), Vulvovaginiti.
- Blenorrea cronica.
- Afte - Stomatiti aftose, (con Alnus glutinosa e Ribes nigrum).
- Gengiviti e piorrea alveolo-dentaria, (con Betula pub. e Quercus).
- Cataratta (con Betula, Ginkgobiloba e Salix alba linfa).
- Infiammazione e ulcerazione degli organi sessuali maschili.
- Indolenza mentale in soggetti piagnucolosi e uggiosi.

CONSIGLI D'USO:30-50 gocce prima dei pasti.

JUNIPERUS COMMUNIS giovani getti

INDICAZIONI:

- Insufficienza epatocellulare: epatite cronica persistente, epatite da farmaci e tossica, grande insufficienza epatica, epatite da citomegalovirus.
- Epatite cronica da insufficienza epatocellulare conclamata (con Secale cereale e Ribes nigrum). Steatosi epatica.
- Cirrosi epatica con epatomegalia (con Alnus incana, Corylus avellana, Lonicera nigra e Rosmarinus officinalis).
- Cirrosi epatica degli alcolisti, (cirrosi alcolica ipertrofica), e idropisia, (con Rosmarinus officinalis e Secale cereale).
- Iperensione portale con ascite iniziale (con Rosmarinus officinalis).
- Coliche epatiche recidivanti.
- Varici esofagee e gastriche secondarie ad epatopatia (con Rosmarinus).
- Diabete mellito, (con Juglans regia gemme, Acer campestre e Morus nigra).
- Ipercolesterolemia, (con Olea europaea).
- Turbe dispeptiche (con Ficus carica).
- Coliche epatiche recidivanti, (con Berberis 3 DH) - (Pol Henry).
- Aerofagia, aerocolia e turbe dispeptiche, (con Juglans regia e Ficus carica), -Sindrome epato-renale.
- Glomerulonefrite.
- Insufficienza renale con ritenzione idrica, (con Fraxinus gemme e linfa di Betula e Betula pubescens scorza interna di radice).
- Pielonefrite cronica (Pol Henry) (con Calluna vulgaris).
- Nefrosi lipoidea (con Fagus sylvatica).
- Obesità con epatopatia steatosica, dismetabolia e idropisia.
- Nefrolitiasi calcica da ossalati, (con Betula, Calluna vulgaris e Fagus).
- Albuminuria (con Betula pubescens radice e Betula verrucosa gemme).
- Oliguria, (con Betula pubescens scorza interna di radice).
- Cistiti recidivanti (con Calluna vulgaris, Vaccinium vitis idaea).
- Congestione prostatica cronica (con Calluna vulgaris).
- Congestione renale cronica. Iperazotemia.
- Gotta e stati iperuricernici, (con Fraxinus e linfa di Betula).
- Artrismo e forme artralgiche - Reumatiche - Artrite gottosa.
- Poliartrite cronica evolutiva (con Ampelopsis e Calluna).
- Dismenoree e leucorree, (con Rubus idaeus).
- Arteriosclerosi (con Acer campestre, Ligustrum vulgare e Olea europaea).
- Virosi recidivanti o persistenti (Citomegalovirus-Mononucleosi ecc.).
- Allergia a seguito di epatite da farmaci e tossico.
- Mastite e mastopatia fibrocistica.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

LIGUSTRUM VULGARE giovani getti

INDICAZIONI:

- Arteriosclerosi, Aterosclerosi, (con Rosmarinus offic.: Lernout).
- Iperlipemia.
- Ipercolesterolemia, (con Linum usitatissimum: Lernout).
- Stomatiti e affezioni del cavo orale.
- Angine (con Juglans regia, Vitis vinifera).
- Afte e mughetto della mucosa orale.
- Escare in soggetti anziani.
- Cellulite (con Castanea vesca, Betula verrucosa linfa).
- Linfedema (con Castanea vesca).
- Leucorrea (con Alnus glutinosa, calluna vulgaris e Juglans regia).
- Artrite (con Juniperus communis).
- Tabagismo, (faringiti croniche granulomatose e polipo se di forti fumatori).
- Craurosi vulvare e sclerosi atrofica della vulva.
- Bronchiti croniche con catarro bronchiale ostinato.
- Diarrea.
- Incanutimento precoce.
- Vertigini.
- Ronzii auricolari, tinnitus, Acufeni.
- Stanchezza degli arti inferiori e delle ginocchia (fortifica caviglie e ginocchia).
- Migliora la vista.
- Nutre lo yin del fegato e del rene.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

LONICERA NIGRA giovani getti

INDICAZIONI:

- Epatomegalia (ristabilisce la funzionalità epatica compromessa).
- Ittero (con Buxus sempervirens, Ilex aquifolium).
- Epatite acuta e cronica (con Rosmarinus e Secale cereale).
- Splenomegalia (con Juglans regia e Tamarix gallica).
- Bronchite acuta (con Carpinus betulus).
- Asma spasmodica (con Viburnum lantana).
- Influenza.
- Tosse convulsa e tosse secca, (con Viburnum lantana e Carpinus betulus).
- Tracheobronchiti: agisce come decongestionante bronchiale, espettorante e sedativo della tosse (con Carpinus betulus).
- Tonsillite.
- Laringite con raucedine e afonia, (con Ribes nigrum).
- Infezioni delle vie respiratorie superiori.
- Singhiozzo (con Ficus carica).
- Artrite e artrite gottosa (con Fraxinus excelsior e J uniperus communis).
- Gotta.
- Edemi e linfedema degli arti inferiori (con Castanea vesca).
- Sindrome colecisto-cardiaca: facilita il riequilibrio tra le funzioni biliari e la peristalsi del muscolo cardiaco.
- Erosioni cervicali.
- Congiuntivite acuta.
- Ferite infette.
- Piodermite (con Juglans regia).
- Depressione psichica con pro stazione e malinconia (con Betula semi).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

MORUS NIGRA gemme

INDICAZIONI:

- Diabete, non insulinodipendente, (tipo II), in associazione ad Acer campestre, Olea europaea e Juglans regia).
- Intolleranza glucidica o diabete sub-clinico.
- Complicanze vascolari del diabetico (con Vaccinium myrtillus).
- Emorragie retiniche del diabetico (con Vaccinium myrtillus).
- Eucinetico della motilità gastro-intestinale (con Ficus carica).
- Afezioni infiammatorie delle vie respiratorie a componente batterica e virale.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

OLEA EUROPAEA giovani getti

INDICAZIONI:

- Iperensione arteriosa, (con Crataegus, Viscum album e Rubus fruticosus).
- Arteriosclerosi cerebrale (con Alnus glutinosa).
- Ipercolesterolemia e dislipidemia (con Juniperus e Linfa di Betula) -Ipertrigliceridemia (con Acer campestre).
- Turbe funzionali intellettuali dell'anziano arteriosclerotico, (con Alnus glutinosa e Sequoia gigantea).
- Angina pectoris (uso prolungato in associazione a Cornus sanguinea, Crataegus oxyacantha e Syringa vulgaris).
- Diabete di tipo II o diabete florido, (con Morus nigra, Acer campestre e Juglans regia).
- Arteriopatia diabetica e gangrena diabetica (con Morus nigra, Cercis siliquastrum e Populus nigra) (Pol Henry).
- Nevrosi fobica: agorafobia, claustrofobia, ecc. (con Prunus amygdalus).
- Nevrosi ossessiva, (con Prunus amygdalus e Tilia tomentosa).
- Arterite temporale di Horton, (con Ribes e Tilia tomentosa).
- Cardiopatia ischemica su base ateromasica, (con Cornus sanguinea, Syringa vulgaris).
- Cardiopatia ipertensiva, (con Crataegus e Cornus sanguinea).
- Tachicardia sopraventricolare (con Crataegus oxyacantha) -Nevralgia facciale, (con Ficus e Acer campestre) (Pol Henry).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

PINUS MONTANA gemme

INDICAZIONI:

- Artrosi "giovanile" dei 40-60 anni.
- Reumatismo cronico degenerativo e Artrosi generalizzata, (con Ribes nigrum, Vitis vinifera e Rubus fruticosus).
- Spondiloartrosi con osteofitosi, artrosi vertebrale.
- Coxartrosi, (con Ribes nigrum, Vitis vinifera e Betula pubescens gemme).
- Dorsalgie (con Ampelopsis).
- Gonartrosi, (con Ribes nigrum, Vitis vinifera, Rosa canina e Rubus fruct.).
- Lombaggine, (con Vaccinium vitis idaea).
- Osteoporosi senile, (con Rubus fruticosus).
- Osteoporosi post-menopausa, (con Rosa canina, Vaccinium vitis idaea, Rubus fruticosus, Sequoia).
- Fratture patologiche e ritardi di consolidamento di fratture (Abies pectinata).
- Artrosi in generale, (con Rubus fruticosus; con Sequoia in caso di insufficienza renale) - (Pol Henry).
- Cefalea muscolo-tensiva secondaria a cervicoartrosi, (con Ribes nigrum, Vitis vinifera e Rosa canina).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

PLATANUS ORIENTALIS gemme

INDICAZIONI:

- Ipergammaglobulinemia.
- Iperplasia reticolo-endoteliale.
- Calazio (con Ficus carica).
- Cisti palpebrale e del bordo ciliare.
- Blefarite (con Juglans regia).
- Orticaria pigmentaria, (C. Binet). Orticaria cronica.
- Drenante per la pelle.
- Acne giovanile e Acne rosacea.
- Vitiligine: somministrare per un periodo di almeno sei mesi - (Pol Henry).
- Flogosi che si ripetono in maniera esasperante.
- Postumi malarici - (Pol Henry).
- Psoriasi (con Cedrus libani e Secale cereale).
- Flogosi del cavo orofaringeo.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

POPULUS NIGRA gemme

INDICAZIONI:

- Arteriti degli arti inferiori, (con Cornus sanguinea e Cercis siliquastrum).
- Insufficienza arteriosa degli arti inferiori, e Claudicatio intermittens, (con Cercis siliquastrum e Prunus amygdalus).
- Arterite trombotica che evolve da uno a più anni con tendenza alla stabilizzazione, (alternato a Betula pubescens ed Alnus glutinosa, ripermeabilizza le arterie e aumenta le oscillazioni nelle arteriti dell' adulto che tendono ad avere evoluzione precoce). Aortite, Angina abdominis (con Cercis).
- Insufficienza arteriosa degli arti inferiori da tabagismo (con Cornus sang.).
- Impotenza sessuale da tabagismo, (con Betula pubescens).
- Piaghe e ulcere atone secondarie a insufficienza arteriosa.
- Arterite dell' arteriosclerotico e del tabagico, (con Cornus sanguinea, Olea e Alnus glutinosa). Morbo di Raynaud.
- Artrosi e artrite degli arti inferiori (ne migliora il circolo) con iperuricemia (con linfa di Betula, Pinus, Ribes, Vitis e Fraxinus) - Artropatia gottosa.
- Poliartrosi.
- Gotta-iperuricemia.
- Antrace (con Juglans regia).
- Cistiti recidivanti, (con Calluna e Vaccinum).
- Bronchiti croniche e tracheiti recidivanti dell'infanzia, (con Ribes, Carpinus betulus e Juglans regia).
- Tromboflebiti e tendenza a manifestazioni trombo emboliche degli arti inferiori, (con Prunus amygdalus scorza interna di radice e Cornus sanguinea).
- Rimedio dell'infiammazione in fase essudativa.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

PRUNUS AMYGDALUS gemme

INDICAZIONI:

- Dismetabolie dislipidemiche.
- Arteriosclerosi dell'anziano iperlipemico e trombofilico, (con *Olea europaea*) - (P. Henry).
Insufficienza arteriosa.
- Arteriosclerosi generalizzata o distrettuale, (con *Rubus fruticosus*).
- Iperensione arteriosa, (con *Olea europaea*).
- Ipercolesterolemia, (con *Olea europaea*).
- Ipertrigliceridemia di tipo IV, (con *Rosmarinus officinalis*).
- Sindromi tromboemboliche da iperprotrombinemia, (scorza interna di radice, con *Citrus limonum* e *Cornus sanguinea*). Eritrocitosi.
- Tromboflebiti.
- Angor coronarico (con *Viscum crataegi* e *Syringa vulgaris*: *Prunus* agisce sulla tolleranza all'eparina, *Viscum* per azione vasodilatatrice dovuta alla Tiramina, *Syringa* per effetto coronarodilatatore).
- Nevrosi fobica, (con *Olea europaea*).
- Nevrosi ossessiva, (con *Olea europaea*).
- Diminuzione della memoria (con *Betula verrucosa* semi).
- Tónico nervino (gemme).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

PRUNUS SPINOSA gemme

INDICAZIONI:

- Deficit immunitario (con Rosa canina).
- Convalescenze prolungate (con Rosa canina).
- Postumi di polmonite.
- Convalescenza post-influenzale (con Rosa canina).
- Debilitazione psico-fisica secondaria a stress.
- Anoressia (con Betula pubescens gemme).
- Inappetenza dei bambini.
- Sindrome da affaticamento generale (con Betula verrucosa semi):
- Sindrome neuroastenica e astenia generale.
- Stati depressivi costituzionali.
- Distonia neurovegetativa e distonia costituzionale (con Ficus carica).
- Anemia (con Tamarix gallica e Corylus avellana).
- Habitus phtisicus.
- Tubercolinismo.
- Disarmonia auxiometrica de bambini.
- Turbe e ritardi di crescita (con Abies pectinata).
- Ritardo del menarca e del pubarca (con Betula pubescens gemme).
- Stasi metabolica; accentua il ricambio organico.
- Oliguria con edemi agli arti inferiori (con Fagus sylvatica, Betula pubescens scorza di radice e Betula linfa).
- Tendenza agli edemi cardiaci e renali.
- Piccola sindrome cardio-renale.
- Angina pectoris (con Syringa vulgaris).
- Insufficienza cardiaca lieve (con Crataegus oxyacantha).
- Bronchite cronica dell' anziano astenico con miocardioastenia.
- Idrope ed edemi associati a cardiopatie.
- Dilatazione del cuore destro (con Crataegus oxyacantha).
- Postumi di bronco-polmonite (con Carpinus betulus e Corylus avellana).
- Coliche addominali di tipo colitico.
- Meteorismo addominale.
- Herpes zoster oftalmico (con Acer campestre).
- Nevralgia ciliare e oculare destra dopo sforzi, come se l'occhio dovesse creparsi.
- Iridociclite e iridocoroidite.
- Spasmi dell' apparato oculare, della vescica e del cuore (con Tilia tomentosa).
- Dolori nevralgici e crampoidi che hanno la caratteristica di irradiarsi a destra.
- Disuria spasmodica e tenesmo vescicale con bisogno imperioso di urinare.
- Dolori al glande e/o all'uretra durante la minzione.
- Astenia primaverUe.
- Ipotonia e ipotensione (con Ribes nigrum e Rosmarinus officinalis).
- Stati di esaurimento generale.
- Acne giovanile e foruncolosi del viso e del corpo (con Juglans regia).
- Danni da inquinamento atmosferico e da sostanze potenzialmente cancerogene.
- Depuratore del sangue in convalescenze o a seguito di danni iatrogeni.
- Rivitalizzante di tutte le funzioni cutanee.
- Retrazioni cicatriziali.
- Postumi di vaccinazione.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

QUERCUS PEDUNCOLATA gemme

INDICAZIONI:

- Depressione, (con Ficus carica e Betula verrucosa semi). -"Surmenage" fisico e intellettuale (con Prunus spinosa).
- Senescenza precoce; l'azione antisenescenza è potenziata se usata con Fraxinus excelsior e Sequoia gigantea.
- Astenia sessuale o frigidità giovanile con depressione, (con Betula pubescens amenti). Astenia primaverile e post-infettiva.
- Adinamia gonadica.
- Ipossurrenalismo, (con Ribes nigrum) con ipotensione arteriosa.
- Astenia sessuale in andropausa e menopausa.
- Shock, cianosi e collasso vascolare, (con Cornus sanguinea).
- Paradontosi, (con Abies pect. e Betula pubescens gemme), con piorrea alveolo dentaria.
- Astenia sessuale dell'uomo anziano, (con Sequoia gigantea e Betula amenti).
- Andropausa (con Sequoia). Astenospermia-Azospermia.
- Stipsi (gemme), (con Vaccinium vitis idaea).
- Allergie varie, (con Ribes nigrum).
- Enuresi notturna.
- Leucorree.
- Atonia vaginale, menorragie della menopausa, metrite.
- Prolasso anale e uterino (con Fraxinus excelsior).
- Fragilità capillare, (con Aesculus hippocastanum), con tendenza a stravasi ed ecchimosi.
- Piaghe da decubito.
- Pelli arrossate, brucianti e doloranti (giovani radici e scorza interna di radice).
- Eczema e ragadi anali, eczemi umidi.
- Connettiviti, dermatopolimiosite.
- Stati di leggera denutrizione (con Prunus spinosa).
- Stati di "surmenage" e fatica, (associati a Quercus pedunculata ghiande).
- Iperidrosi, linfatismo.
- Turbe mestruali (con Rubus idaeus e Salix alba).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

RIBES NIGRUM gemme

INDICAZIONI:

- Iposurrenalismo (con Quercus pedunculata e Prunus spinosa).
- Astenia e debilitazione psico-fisica (con Prunus spinosa).
- Dermatiti e dermatosi. Eczema atopico.
- Orticaria cronica (con Alnus glutinosa e Mentha aquatica).
- Sindromi allergiche acute in generale.
- Sindromi infiammatorie locali e generali specie a livello mucosale, epiteliale, re spiratorio, digestivo e urinario.
- Riniti e Rinofaringiti recidivanti, (con Rosa canina e Abies pectinata).
- Sinusiti, (con Alnus glutinosa e Carpinus betulus).
- Enfisema polmonare, (con Coryllus avellana).
- Bronchiti croniche complicate, (con Carpinus betulus, Viburnum lantana e Juglans regia).
- Parotite.
- Riniti, oculoriniti e congiuntiviti allergiche stagionali (raffreddore da fieno, riniti spasmodiche).
- Asma bronchiale di tipo allergico, bronchiti allergiche (con Viburnum).
- Edema di Quinke in tutte le sue localizzazioni: (glottide, labbra, palpebre, ecc.).
- Shock anafilattici secondari ad antibiotico terapia o punture d'insetti, (con Alnus glutinosa).
- Orticaria e dermatiti allergiche, eczemi, sensibilizzazione ai farmaci.
- Eritemi solari, (con Ficus carica).
- Artrosi in soggetti di età inferiore ai 60 anni (40-60 anni), gonartrosi, coxartrosi, ecc., (con Pinus montana e Vitis vinifera).
- Artrite, poliartrite, pelvispondilite anchilosante, artrite psoriasica e tutte le forme di reumatismo infiammatorio, (con Ampelopsis veitchii, Pinus montana, Vitis vinifera).
- Cefalea vasomotoria, emicranie allergiche e sindromi cefalalgiche.
- Stati adinamici con ipotensione arteriosa a Astenia, (con Quercus pedunculata).
- Arterite temporale di Horton, (con Cornus sanguinea).
- Sindromi febbrili virali, influenzali, mononucleosi infettiva (con Alnus glutinosa: 125 gocce alternate ogni 2-3 ore e con Betula pubescens).
- Gastrite, (con Ficus carica).
- Epatiti croniche (con Secale cereale e Juniperus communis).
- Pancreatite cronica, (con Juglans regia).
- Dismetabolismo: attiva il catabolismo dell'acido urico, dell'urea e del colesterolo, stimolando gli 11-ossisteroidi.
- Adenoma della prostata, (con Sequoia gigantea).
- Prostatite cronica, (con Sequoia gigantea, Quercus pedunculata, Betula puscens e Calluna vulgaris).
- Cisti ovariche e fibroma uterino, (con Rubus idaeus).
- Malattia di Dupuytren, (con Ampelopsis weitchii).
- Malattia di Peyronie, (con Ampelopsis veitchii).
- Morbo di Ledderhose (con Ampelopsis) -Retinopatie e disturbi della percezione visiva nelle ore crepuscolari (con Vaccinium myrtillus). Emeralopia.
- Lesioni retiniche, retinopatia diabetica (con Morus nigra e Juglans regia).
- Atrofia del nervo ottico (con Acer campestre). Emianopsia.
- Diminuzione dell'acuità visiva (con Vaccinium myrtillus).
- Glomerulonefrite acuta post-infettiva, con mesangite da focolai microbici (accelera il processo di risoluzione dell'affezione).
- Anti-infettivo.
- Rimedio di ogni stato flogistico in fase essudativa - (Pol Henry).
- Protettivo delle mucose.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

ROSA CANINA giovani getti

INDICAZIONI:

- Rinofaringiti, tracheobronchiti, otiti, tonsilliti recidivanti dell'infanzia, (con Ribes nigrum, Abies pectinata, Betula pubescens).
- Foruncolosi recidivanti, (con Ficus carica e Juglans regia).
- Profilassi antiinfluenzale.
- Infiammazioni periungueali - (Pol Henry).
- Decalcificazione ossea e demineralizzazione giovanile, (con Abies).
- Dimagrimento (con Prunus spinosa).
- Disordini e ritardi di crescita nel bambino, (con Abies pectinata e Betula verrucosa: i 2 gemmoderivati osteoblastici per eccellenza); con Prunus spinosa), per armonizzare la crescita.
- Anemia, (con Tamaris gallica).
- Astenia post-influenzale e post-infettiva (con Ribes nigrum e Quercus pedunculata).
- Cefalea vasomotoria ed emicranie (con Ribes nigrum e Alnus glutinosa).
- Coliti.
- Gozzo eutiroideo-adenoma, (con Cornus sanguinea).
- Eczema pustoloso palmo-plantare, (con Buxus sempervirens e Ulmus campestris).
- Pruriti e starnuti.
- Eczemi.
- Osteoporosi post-menopausa (con Pinus montana e Rubus fruticosus)
- Herpes recidivante e oculare, (con Ulmus campestris).
- Freddosità e stati di algidità (con Ribes nigrum e Quercus pedunculata).
- Diarrea cronica e dissenteria cronica.
- Allergie e asma bronchiale allergico (con Ribes nigrum).
- Verruche (con Vitis vinifera e Ficus carica).
- Disurie. - (Max Tétau).
- Flogosi localizzate recidivanti.
- Sinoviti e artrosinoviti (con Pinus montana e Ribes nigrum).
- Angiopsatirosi e fragilità dei vasi capillari, (con Aesculus).
- Ipogamma globulinemia secondaria a terapie antibiotiche.
- Facile affaticamento.
- Esaurimento generale.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

ROSMARINUS OFFICINALIS giovani getti

INDICAZIONI:

- Piccola insufficienza epatica; azione rigeneratrice sulla funzionalità delle cellule epatiche, (con Juniperus communis e Secale cereale).
- Insufficienza epato-biliare.
- Dispepsia da atonia digestiva e della colecisti.
- Coliche epatiche e discinesie delle vie biliari con iper e ipotonia -Steatosi epatica, (con Juniperus communis e Olea europaea).
- Epatomegalia (con Lonicera nigra).
- Cirrosi epatica, (con Juniperus communis, Ribes nigrum e Secale cereale).
- Colecistiti croniche e colecistopatie con o senza calcolosi.
- Ascite: piccola ascite con grosso fegato (con Juniperus communis).
- Litiasi biliare, (con Fraxinus excelsior e Acer campestre).
- Ipercolesterolemia e dislipidemie con ipertrigliceridemia (con Prunus amygdalus, Juniperus communis e Olea europaea).
- Iposurrenalismo (con Ribes nigrum, Prunus spinosa e Quercus).
- Iper-uricemia, (con Linfa di Betulla e Fraxinus excelsior).
- Senescenza precoce maschile, (con Sequoia e Quercus pedunculata).
- Diabete mellito (con Morus nigra, Juglans regia, Vaccinium myrtillus).
- Turbe del ricambio.
- Impotenza (con Fraxinus excelsior semi).
- Senescenza precoce femminile, (con Vaccinium vitis idaea e Rubus).
- Andropausa e astenia sessuale maschile (con Sequoia gigantea, Quercus pedunculata e Betula pubescens).
- Frigidità, anafrodisia.
- Menopausa, (con Vaccinium vitis idaea e Rubus idaeus).
- Allergie croniche da profonda intossicazione dell' organismo, (con Ribes nigrum e Fagus sylvatica).
- Adiposità generalizzata o localizzata (con linfa di Betulla e Fagus sylvatica).
- Iperidrosi (con Quercus pedunculata).
- Alopecia.
- Sovraccarichi ponderali, (con Juniperus communis e Fraxinus).
- Diminuzione della memoria (con Betula verrucosa semi e Prunus amygdalus gemme).
- Dismenorrea, (con Rubus idaeus e Salix alba amenti).
- Amenorrea secondaria, (con Rubus idaeus, Ficus carica e Salix alba).
- Arteriosclerosi, (con Olea europaea).
- Ipotensione, (con Ribes nigrum e Quercus pedunculata).
- Tendenza alle lipotimie (con Ribes nigrum e Prunus spinosa) >t<Aerogastria, (con Juglans regia).
- Sequele di paralisi, (con Acer campestre) - (Max Tétou).
- Iperfosfatemia alcalina.
- Turbe della circolazione periferica, atonia e insufficiente irrorazione periferica.
- Turbe della termoregolazione.
- Distonia vegetativa (con Ficus carica e Prunus spinosa).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

RUBUS FRUCTICOSUS giovani getti

INDICAZIONI:

- Insufficienza respiratoria ostruttiva.
 - Bronchite cronica ostruttiva (con *Alnus glutinosa*, *Carpinus betulus* e *Ribes nigrum*).
 - Enfisema polmonare, con diminuzione della VEMS e aumento del volume residuo, (con *Corylus avellana* e *Ribes nigrum*).
 - Osteoporosi senile-dolorosa, (con *Sequoia gigantea*, *Vaccinium vitis idaea* e *Pinus montana*).
 - Osteoartrite generalizzata e reumatismo cronico degenerativo che insorge dopo i 60 anni, (con *Ribes nigrum*, *Pinus montana* e *Vitis vinifera*).
 - Osteoporosi post-menopausa, (con *Vaccinium vitis idaea*, *Sequoia gigantea*).
 - Gonartrosi, (con *Ribes nigrum*, *Vitis vinifera*, *Pinus montana* e *Rosa canina*).
 - Coxartrosi (con *Ribes nigrum*, *Pinus montana*, *Betula pubescens* e *Vitis vinifera*).
 - Tiflite (con *Ficus carica* e *Ribes nigrum*).
 - Nefrite interstiziale cronica con o senza pielonefrite, (con *Fagus sylvatica*).
- Nessuna o poca azione nei danni renali da fenacetina.
- Ipertensione arteriosa, (con *Olea europaea*, *Crataegus oxyacanta* e *Prunus amygdalus*).
 - Fibromi uterini, (con *Alnus incana*, *Rubus idaeus* e *Vaccinium vitis idaea*).
 - Arteriosclerosi, (con *Olea europaea*, *Acer campestre* e *Prunus amygdalus*). -Diabete senile e Diabete florido (con *Morus nigra*, *Acer campestre*, *Juglans regia* e *Juniperus communis*).
 - Sterilità maschile (con *Betula pubescens amentis* e *Sequoia gigantea*).
 - Antisenescente, (con *Juniperus communis* e *Rosmarinus*).
 - Jalinosi, (con *Calluna vulgaris*).
 - Fibrosclerosi (con *Fagus sylvatica*).
 - Angina eritematosa.
 - Candidosi orale (con *Buxus sempervirens*).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

RUBUS IDAEUS giovani getti

INDICAZIONI:

- Ipogonadismo della pubertà femminile (amenorrea, pelosità, sviluppo mammario, ecc.).
- Amenorrea e oligomenorrea di tutte le età (con *Salix alba* amenti).
- Dismenorrea della donna giovane e in pre-menopausa.
- Sindrome iperfollicolinica pre-mestruale (mastodinia, ritenzione idrica, acne, ecc.).
- Sterilità femminile (con *Ficus carica*, *Salix alba* amenti, *Viburnum lantana*).
- Aborto abituale - Minaccia d'aborto.
- Menorragie della premenopausa da iperplasia endometriale.
- Amenorrea secondaria da menopausa precoce e/o iatrogena.
- Cisti ovarica, (con *Ribes nigrum*), e micropolicistosi dell'ovaio.
- Fibroma uterino (con *Alnus incana*, *Sequoia*, *Ribes nigrum* e *Rubus fruct.*).
- Mastopatia fibrocistica, (con *Alnus incana* e *Ilex aquifolium*).
- Metrorragie funzionali.
- Turbe neurovegetative pre-mestruali, (con *Salix alba* amenti).
- Turbe della libido.
- Frigidità (con *Betula pubescens* amenti e *Rosmarinus officinalis*).
- Senescenza femminile, (con *Rosmarinus* e *Vaccinum vitis idaea*).
- Metriti e/o Vaginiti.
- Arteriosclerosi (se associato ad altri gemmoterapici).
- Oliguria e litiasi urinaria (se associato ad altri gemmoterapici).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

SALIX ALBA gemme, amenti, scorza di stelo, linfa.

INDICAZIONI:

Le gemme:

- Isteria.- Insonnia nervosa.

Gli amenti:

- Nevrosi gastrica e turbe dispeptiche psicosomatiche (con Ficus e Tilia).
- Stati di angoscia e ansietà (con Tilia).
- Eretismo sessuale (maschile e femminile: riporta il desiderio sessuale a livelli fisiologici).
- Ninfomania (con Salix alba amenti) - Priapismo (con Salix alba amenti).
- Anemia: incrementa la produzione di emazie e potenzia l'attività terapeutica di altri rimedi antianemici (con Tamarix gallica).
- Amenorrea.
- Ipereccitabilità sessuale o eretismo genitale.
- Coliche uterine.
- Dismenorrea e turbe nervose che ne conseguono.
- Dolori pelvici.- Sindrome premestruale.
- Sterilità con ipoestrogenia.
- Disturbi da menopausa.
- Ipo-oligo menorrea.
- Ninfomania.
- Onanismo.- Priapismo.
- Eiaculazione precoce.
- Spermatorrea.
- Disormonosi femminile.
- Coliche biliari.
- Dispepsia cloridrica e lenterica.
- Angoscia di guerra (Renon).

Scorza di giovane ramo:

- Fibromialgie e reumatismo muscolare. giovane ramo - Artrite articolare degenerativa.
- Artrosi generalizzata (con Ribes nigrum, Pinus e Vitis vinifera).
- Artrosi delle piccole articolazioni (con Vitis vinifera).
- Poliartrite acuta.- Reumatismo articolare acuto.

La linfa:

- Rizartriosi. - Iperidrosi.
- Stati febbrili.- Sudori notturni.
- Sindrome influenzale con iperpiressia e artralgie.
- Reumatismi articolari.
- Nevralgie reumatiche.
- Intorbidamento del cristallino. - Intorbidamento del corpo vitreo.
- Degenerazione fibrinoide del corpo vitreo.
- Polimerizzazione del corpo vitreo.
- Uveite anteriore e posteriore (coadiuvante con Ribes nigrum e Vaccinium myrtillus).
- Offuscamenti della vista.
- Infiammazioni oculari.
- Miodesopsie.
- Cataratta (con Betula pubescens gemme).
- Congiuntivite stagionale (con Ribes nigrum).
- Opacamento corneale.
- Reumatismo oculare (con Ilex aquifolium).
- Rinforza la vista ed aumenta la capacità visiva (con Vaccinium myrtillus).
- Vitalizzazione del visus senile.

CONSIGLI D'USO: 30-50 gocce prima dei pasti.

SECALE CEREALE giovani radici

INDICAZIONI:

- Epatite acuta e sub-acuta.
- Epatite cronica persistente, (con Juniperus e Ribes nigrum).
- Piccola insufficienza epatica, (con Rosmarinus officinalis).
- Cirrosi epatica, con fegato ridotto di volume (con Corylus avellana).
- Cirrosi epatica con epatomegalia, (con Juniperus communis).
- Psoriasi, (con Cedrus libani e Platanus orientalis).
- Steatosi epatica, (con Olea europaea e Rosmarinus officinalis).
- Itteri infettivi e postumi di ittero.
- Itteri familiari Dubin Jonshon, (in associazione con Juniperus communis e Rosmarinus).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

SEQUOIA GIGANTEA giovani getti

INDICAZIONI:

- Antisenescente - Rivitalizzante, (con Quercus pedunculata, Fraxinus, Rosmarinus officinalis e Vaccinium vitis idaea).
- Neuroastenia, psicastenia e sindromi depressive dell'anziano.
- Anoressia.
- Artrosi senile.
- Vertigini su base arteriosclerotica (con Alnus glutinosa e Ampelopsis) H. Lernout; (con Ginkgo biloba e Alnus glutinosa).
- Turbe trofiche e psichiche della senescenza.
- Ipertrofia prostatica.
- Adenoma prostatico in fase iniziale.
- Malattia delle ossa di Verres, dove elimina le fratture semispontanee.
- Ritardo nel consolidamento di fratture nell'adulto (con Quercus pedunculata e Abies pectinata).
- Fibromi uterini, (con Ribes nigrum, Rubus idaeus e Alnus incana).
- Osteoporosi senile, (con Rubus fruticosus e Vaccinium vitis idaea).
- Insufficienza surrenalica funzionale, (con Ribes nigrum e Quercus pedunculata).
- Sindrome da "surmenage" ed affaticamenti eccessivi, (con Ribes nigrum e Quercus pedunculata).
- Andropausa e sindromi da senescenza maschile, (con Quercus pedunculata).
- Involuzione cerebrale senile (con Alnus glutinosa e Olea europaea).
- Menopausa e sindrome da senescenza femminile (con Rubus e Vaccinum) - Senescenza sessuale delle gonadi maschili (con Betula pubescens Quercus e Rosmarinus).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

SORBUS DOMESTICA gemme

INDICAZIONI:

- Varici e terreno varicoso: è un regolatore della circolazione venosa.
- Insufficienza venosa, varici degli arti inferiori (con Castanea vesca).
- Varici vulvari e vaginali (con Castanea e Aesculus).
- Flebite e sindrome corre lata.
- Sindromi venose pleoriche prima del danno trombotico, caratterizzate da senso di pesantezza agli arti inferiori con acroparestesie. (Dopo il danno trombotico è indicato Alnus glutinosa).
- Sindromi da insufficienza venosa: edemi, varicosità, senso di peso agli arti inferiori, ecc. (con Castanea vesca).
- Sindrome da iperviscosità con rallentamento della circolazione.
- Postumi di flebite, (con Alnus glutinosa).
- Ulcere varicose.
- Ipertensione venosa, (con Aesculus hippocastanum).
- Emorroidi (con Aesculus).
- Disturbi circolatori da climaterio: vampate di calore, cefalea congestizia, parestesie alle estremità, disturbi della pressione arteriosa con aumento della minima; (è interessante notare, che le foglie avrebbero effetto opposto: sarebbero indicate per aumentare la pressione arteriosa, mentre le gemme in diluizione I DR, tenderebbero a fare l'opposto).
- Acufeni e ronzii auricolari da spasmo vascolare (con Olea europaea) -ipoacusia e sordità da timpanosclerosi, (con Alnus glutinosa, Ilex aquifolium e Viburnum lantana).
- Aumento della pressione minima in menopausa.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

SYRINGA VULGARIS gemme

INDICAZIONI:

- Angina pectoris e sindromi coronariche (con Cornus sanguinea e Crataegus Oxyacantha) .
- Miocardio-coronario-sc1erosi, (con Alnus glutinosa e Crataegus Oxyacantha).
- Insufficienza coronarica (con Cornus sanguinea in fase pre-infarto) -Esiti di infarto miocardico, (con Zea mais e Alnus glutinosa).
- Coronariti trombotiche, (con Cornus sanguinea e Crataegus oxyacantha).
- Preventivo dell'infarto miocardico, (con Cornus sanguinea e Citrus limonum).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

TAMARIX GALLICA giovani getti

INDICAZIONI:

- Anemie ipocromiche e normocromiche, (con *Corylus avellana*).
- Trombocitopenie acquisite e secondarie a malattie infettive e virali, post-parotite, rosolia, mononucleosi infettiva, epatite virale, ecc.
- Piastrinopenie focali, (da foci, spine irritative, granulomi, calcoli biliari).
- Sindromi emorragiche piastrinopeniche.
- Granuloma eosinofilo, (con *Ficus carica*).
- Mononucleosi infettiva, (con *Ribes nigrum*).
- Linfocitosi (con *Vitis vinifera*).
- Epatite da citomegalovirus (con *Juniperus*).
- Febbri eruttive.
- Leucopenia.
- Malattia di Hand-Schuller-Christian o Istiocitosi diffusa cronica (Pol Henry).
- Tensione addominale da coliche flatulente - aerocolia del lattante e del piccolo bambino con eruttazioni eccessive.
- Anoressia (con *Prunus spinosa*), dimagrimento.
- Turbe e ritardi della crescita ponderale; magrezza eccessiva (con *Prunus spinosa*).
- Ipercolesterolemia.
- Disturbi della dentizione (con *Abies pectinata*).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

TILIA TOMENTOSA gemme

INDICAZIONI:

- Distonie neurovegetative e manifestazioni funzionali dell' ansia.
- Nevrosi d'angoscia mal definita e sindrome ansiose (con *Acer campestre*).
- Nevrosi ossessiva, (con *Olea europaea* a *Prunus amygdalus*).
- Epilessia-piccolo male, assenze con brevi sospensioni della coscienza o con semplici automatismi dei quali il paziente non serba ri cordo, (con *Ilex aquifolium*) - (Pol Henry).
- Insonnia dell'adulto e del bambino.
- Iperemoti vità.
- Eretismo cardiaco con palpitazioni, tachicardia e ansia, (con *Crataegus*).
- Precordialgie atipiche e lievi spasmi coronarici, (con *Crataegus* e *Syringa vulgaris*).
- Dolori della prima dentizione.
- Lieve ipertensione arteriosa da stress, (con *Olea europaea*).
- Coliche addominali gassose del neonato (con *Tamarix gallica*).
- Svezramento da sonniferi.
- Svezramento da cimetidina e Ranitidina, (con *Ficus carica* e *Ribes nigrum*).
- Disfagia esofagea, (con *Ficus carica*).
- Bulimia (con *Ficus carica*).
- Sindrome delle gambe senza riposo (Restless legs disease), (con *Ficus carica* e *Viscum album*).
- Discinesia biliare ipertonica.
- Gastralgie (con *Ficus carica*).
- Coliti spastiche, (con *Vaccinum vitis idaea*).
- Sindrome ipertiroidea, (con *Cornus sanguinea*, *Viburnum lantana* e *Crataegus oxyacantha*).
- Spasmodifilia, (con *Ficus carica* e *Abies pectinata*).
- Turbe spasmodiche di etiologia corticale.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

ULMUS CAMPESTRIS gemme

INDICAZIONI:

- Crosta lattea, (con Juglans regia).
- Alopecia seborroica.
- Eczema acuto o vampata eczematosa, (con Ribes nigrum).
- Eczemi trasudanti, (con Ribes nigrum).
- Sudorazione acida e traspirazioni maleodoranti.
- Dermatosi umide, trasudanti.
- Dermatosi pustolose, (con Juglans regia).
- Dermatosi ribelli.
- Eczemi vescicolosi non infetti, (con Ribes nigrum). Se infetti, con Juglans regia).
- Dermatosi squamose e bollose.
- Impetigine (con Juglans regia).
- Orticaria (con Ribes nigrum).
- Piaghe icorose, (con Juglans regia).
- Pelli grasse e lucenti.
- Acne giovanile (con Juglans regia, Ribes nigrum e Platanus orientalis).
- Idrosadenite ascellare, (con Juglans regia).
- Afte, stomatite aftosa.
- Herpes (con Juglans regia).
- Herpes recidivanti, herpes oculari, (con Rosa canina) - (P. Henry).
- Sindrome iper-gamma con tendenza alla fibrosclerosi.
- Iper-uricemia e gotta, (con Fraxinus excelsior).
- Rimedio di ogni stato flogistico in fase essudativa, (Pol Henry).
- Leucorrea e catarri vaginali, cervicite.
- Ustioni.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

VACCINIUM MYRTILLUS giovani getti

INDICAZIONI:

Il gemmoderivato riconferma le proprietà della tradizione fitoterapica del Mirtillo ma con un raggio d'azione più ampio e globale di quanto non facciano le sole bacche o le sole foglie. Le più importanti indicazioni cliniche sono:

- Colibacillosi intestinale.
- Enteriti infantili.
- Diarrea e dissenteria anche di origine infettiva (*Juglans regia* e *Vaccinium vitis idaea*).
- Disbiosi intestinale (con *Juglans regia*).
- Coliti mucomembranose (con *Vaccinium vitis idaea*).
- Meteorismo ed eccessiva fermentazione intestinale (con *Juglans regia*).
- Cistite colibacillare e/o batterica (con *Calluna vulgaris* e *Vaccinium vitis idaea*).
- Afezioni catarrali.
- Afta buccale e gengivo-stomatite aftosa (con *Alnus glutinosa* e *Juglans*).
- Stomatite ulcero-membranosa. Eczema anale.
- Ulcera gastrica e duodenale: agisce solo come cicatrizzante della lesione mucosale (con *Ficus carica* ed *Alnus glutinosa*).
- Diabete mellito florido (con *Morus nigra*).
- Intolleranze glucidiche (con *Morus nigra*).
- Ulcerazioni diabetiche (con *Morus nigra*).
- Retinopatia diabetica (con *Morus nigra*).
- Disturbi visivi.
- Emeralopia. Erniropsia (con *Ribes nigrum*).
- Nictalopia, diminuita capacità visiva nelle ore notturne o "cecità" crepuscolare: aumenta il potere di adattamento oculare alla visione notturna favorendo la rigenerazione della rodopsina, elemento fotosensibile dei bastoncelli retinici. Aumenta il senso luminoso nelle ore notturne e migliora il campo visivo.
- Diminuzione dell'acuità visiva e Miopia elevata.
- Degenerazioni tappeto-retiniche periferiche (con *Fraxinus excelsior*).
- Retinopatia ipertensiva; come protettivo vascolare (con *Olea europaea*).
- Esiti di distacco retinico parcellare (con *Ribes nigrum*).
- Retinite (con *Fraxinus* e *Ribes nigrum*).
- Retinite pigmentaria (con *Fraxinus* e *Ribes*).
- Retinopatia alba (con *Fraxinus*).
- Retinopatia senile (con *Fraxinus* e *Ginkgo biloba*).
- Uveite (con *Fraxinus* e *Salix alba* linfa).
- Microarteriopatie; stati di fragilità e alterata permeabilità dei capillari sanguigni (con *Aesculus hippocastanum*).
- Trombofilia ematica e stati di iperaggregabilità piastrinica (con *Citrus limonum*, *Cornus sanguinea* e *Prunus amygdalus*).
- Eccesso di Urea (con *Betula linfa*, *Fagus sylvatica*).
- Stasi venosa e insufficienza venosa agli arti inferiori (con *Aesculus hippocastanum* e *Castanea vesca*).
- Acne con pelle grassa e pustolosa (con *Ulmus campestris*).
- Couperose.
- Disfunzioni connetti vali del mantello cutaneo.
- Pelle avvizzita secca e afflosciata: azione eutrofica sul tessuto connettivale dermico.
- Distireosi (Dott. Reckeweg).
- Fasi neoplasmatiche e fasi cellulari in genere (virosi); ha effetti catalizzanti sulla respirazione cellulare (Dott. Reckeweg).
- Iperuricemia
- gotta.
- Enuresi notturna (con *Quercus pedunculata*).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

VACCINIUM VITIS IDAEA giovani getti

INDICAZIONI:

- Ialinosi arteriosa e arteriolare: arteriosclerosi ialina di tipo senile dove il trombo è ialinizzato con degenerazione della parete vasale.
- Ialinizzazione connettivale (rimedio contro l'invecchiamento prematuro in associazione a Fraxinus excelsior, Rosmarinus officinalis, Quercus pedunculata e Sequoia gigantea).
- Ialinosi post-infiammatoria.
- Ialinosi ovarica post-menopausa: Vaccinium vitis idaea provoca una riattivazione estrogenica sul tessuto ovarico. E' pertanto indicato in situazione di ormoni di sintesi, qualora vi sia il sospetto o il rischio di neoformazioni, (con Rubus fruticosus, Rubus idaeus).
- Tumori benigni ialinizzati: fibromiomi uterini (con Rubus fruticosus e Alnus incana), adenomi tiroidei, ecc..
- Ialinosi degli essudati e dei trombi, (fibrosi ialinizzata): esiti di embolia polmonare, ialinizzazione dei glomeruli renali da ialinosi tubulare da sovraccarico, sindromi nefrosiche da ialinosi focale e segmentaria.
- Necrosi delle estremità da cangrena senile torpida.
- Necrosi delle estremità da cangrena diabetica.
- Colon irritabile e colite spastica (con Ficus carica e Tilia tomentosa).
- Meteorismo intestinale da dismicrobismo e disbiosi intestinale (con Juglans regia).
- Cistite acuta (con Vaccinium myrtillus e Calluna vulgaris).
- Cistiti recidivanti (con Calluna vulgaris e Juniperus).
- Alterazione del transito intestinale nei casi sia di diarrea che di stipsi, o di alternanza di entrambe. E' il regolatore della funzionalità intestinale.
- Colibacillosi intestinale (con Vaccinium myrtillus).
- Disbiosi intestinale per alterazione della flora batterica.
- Colibacillosi urinaria e ciclo entero-renale del colibacillo: cistiti croniche da bacillo di Eberth; pollachiuria, disuria, piurie, uretriti, cistopieliti, (con Calluna vulgaris e Vaccinium myrtillus).
- Sindromi nefrosiche con ialinosi segmentaria focale, (Pol Henry).
- Senescenza ormonale (con Rosmarinus, Rubus idaeus).
- Disturbi della premenopausa e menopausa (con Salix alba e Rubus idaeus).
- Sterilità con ipoestrogenia (con Salix alba amenti).
- Lombaggine (con Pinus montana).
- Osteartrosi e osteoporosi, dopo i 60 anni, (con Rubus fruticosus, Sequoia gigantea, Pinus montana, Ribes nigrum, Vitis ecc.).
- Antisenescente femminile, (con Rubus idaeus e Rosmarinus officinalis).
- Iper-fosfatemia acida.
- Prostatiti e adenoma della prostata.
- Cancro della prostata (coadiuvante). (Pol Henry) - (con Sequoia gigantea e Viscum album).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

VIBURNUM LANTANA gemme

INDICAZIONI:

- Asma bronchiale allergica semplice o intricata.
- Asma episodica, intermittente, peridica o continua.
- Asma con super-infezione su terreno allergico, (Pol Henry).
- Asma non allergica di origine intrinseca con dispnea continua (con Crataegus oxyacantha: Pol Henry).
- Bronchite cronica asmatiforme.
- Dispnea asmatiforme sibilante.
- Tosse convulsa (con Lonicera nigra).
- Eczema atopico (in associazione a Melittis melissophyllum: P. Henry)
- Morbo di Basedow (in associazione a Cornus sanguinea: Pol Henry).
- Ipoacusia o sordità da timpanosc1erosi, da catarro tubarico o da spasmo vascolare, (con Sorbus domestica e Ilex aquifolium).
- Acufeni, (con Sorbus domestica).
- Aborto abituale, minaccia d'aborto, parto prematuro.
- Sterilità femminile (con Ficus carica, Rubus idaeus, Salix alba amenti).
- Dismenorrea (con Salix alba amenti).
- Ovarialgia (con Salix alba amenti).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

VISCUM ALBUM giovani getti

INDICAZIONI:

- Sindromi epilettiche, spasmi, convulsioni, piccolo male.
- Agitazione continua di muscoli facciali, (*Loranthus europaeus*).
- Epilessia anche da lunga data in donne che soffrono di metrorraggie o irritazioni dell'utero.
- Corea.
- Isteroepilessia. Crisi di Bravais-Jackson.
- Atetosi.
- Turbe croniche del metabolismo con diabete: riattiva completamente il ricambio (con *Rosmarinus officinalis*).
- Attacchi improvvisi di vertigini.
- Sindromi vertiginose persistenti dopo crisi epilettiche con malumore e irriquietezza che degenera in paura.
- Impossibilità a tenere fermi gli arti (irritazione spinale).
- Sindrome delle gambe senza riposo (*Restless legs disease*) (con *Tilia* e *Ficus*).
- Nevralgie, sciatica e lombalgia irradiata alla natica destra ed aggravata dal minimo movimento.
- Arteriosclerosi con pericolo di colpo apoplettico.
- Vasculopatia cerebrale.
- Esiti di ictus cerebrale, (con *Alnus glutinosa*).
- Ipertensione con albuminuria.
- Ipertensione arteriosa su base aterosclerotica (*Viscum crataegi*) - (con *Olea europaea* e *Crataegus oxyacantha*).
- Improvvisi attacchi di vertigine (con *Sorbus domestica*).
- Asma cardiaca (con *Crataegus* e *Viburnum*).
- Reumatismo cronico, gottoso, con dolori laceranti.
- Nefriti croniche su base aterosclerotica e con iperazotemia.
- Sindromi dolorose alternanti alla spalla e al gomito, al ginocchio e alla caviglia.
- Menorragia, metrorragia.
- Lentezza di travaglio, ritenzione placentare.
- Disturbi della menopausa (con *Vaccinium vitis idaea*).
- Sordità catarrale, reumatica, ronzii auricolari (con *Ilex aquifolium*).
- Tosse spasmodica con forte rantolo catarrale nei bronchi.
- Stato asmatico.
- Cancro, precancerosi, neoplasie e carcinogenesi (con *Buxus*). Forme carcinomatose a localizzazione diversa rispondono in rapporto a diverse varietà di Vischio. Il Vischio dell'Olmo è più attivo per il cancro polmonare. Il Vischio del Pino per certi tumori superficiali. Il Vischio del Pioppo (*Populus tremuloides*) per il carcinoma della vescica e del rene
- Lesioni da raggi.
- Per la sua attività antisclerotica risulta utile nei disturbi da menopausa e andropausa, in certe forme di enfisema polmonare e nell'ipertrofia cardiaca sinistra e destra con iniziale cuore polmonare, nelle vasculopatie cerebrali arteriosclerotiche (con *Alnus glutinosa* e *Olea*).
- I soggetti che rispondono meglio all'azione di *Viscus album*, (qualunque sia l'indicazione clinica) sono gli individui che si aggravano con il tempo freddo, il vento di tramontana e il clima temporalesco. Tutti i disturbi sopraelencati peggiorano durante l'inverno, con il movimento e coricandosi sul lato sinistro, di sera e di notte. Migliorano invece con la sudorazione.

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

VITIS VINIFERA gemme

INDICAZIONI:

- Afezioni fibroialinosiche.
- Rettocolite granulomatosa o Morbo di Crohn, (scorza delle radici e radici secondarie in alternanza con *Ayuga reptans*).
- Sarcoidosi: la scorza di radice e radici secondarie, possiedono una netta azione nei confronti di questa malattia.
- Tutte le afezioni Ipergamma e le sindromi contraddistinte da iper gammaglobulinemia.
- Sindromi Iperimmuni policlonali che evolvono verso la fibrosclerosi (Pol Henry).
- Postumi di reumatismi articolari acuti, con netta azione sul titolo streptolisinico. Accorcia l'evoluzione della malattia ed evita le complicazioni (con *Ampelopsis*, *Ribes nigrum* e *Rosa canina*).
- Artrite deformanti delle piccole articolazioni, (con *Spirea ulmaria* e *Salix alba*).
- Artrosi generalizzata e reumatismo degenerativo cronico, (con *Pinus montana* e *Ribes nigrum*).
- Leucocitosi con linfocitosi (con *Juglans regia* e *Tamarix gallica*).
- Coadiuvante nei linfomi (con *Juglans*).
- Coxartrosi (con *Betula pubescens* e *Ribes nigrum*).
- Gonartrosi (con *Pinus montana* e *Ribes nigrum*).
- Artrosi con iperuricemia, (con *Betula linfa*, *Pinus montana* e *Ribes nigrum*).
- Osteoporosi, (con *Vaccinium vitis idaea*, *Rubus fruticosus*, *Pinus montana*, *Ribes nigrum* e *Sequoia gigantea*).
- Artrosi con spondilosi osteofitosica.
- Verruche (con *Ficus carica* e *Rosa canina*).
- Angine recidivanti (con *Juglans regia*). Rinofaringiti recidivanti.
- Cefalea muscolo tensiva da cervicoartrosi, (con *Ribes nigrum*, *Pinus montana* e *Rosa canina*).
- Couperose - Acne rosacea. Rinofima.
- Emorragie uterine della menopausa.
- Neoformazioni cutanee (con *Alnus incana* e *Buxus*).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.

ZEA MAYS giovani radici

INDICAZIONI:

- Sindromi post-infartuali (con Cornus sanguinea), favorisce la cicatrizzazione del miocardio nel periodo post-infartuale.
- Insufficienza coronarica (con Cornus sanguinea e Syringa vulgaris).
- Infarto miocardico.
- Miocardio-angio-sclerosi (con Syringa vulgaris).
- Epatite virale e (con Corylus avellana e Secale cereale).

CONSIGLI D'USO:

30-50 gocce prima dei pasti.